



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA

LETO 2009

KAZALO VSEBINE

| | |
|--|-----------|
| 1. NAJMANJŠA POVRŠINA..... | 5 |
| 2. OBVEZNOSTI PRIDELOVALCA VINA ZA ZAGOTOVITEV SLEDLJIVOSTI.5 | 5 |
| 3. GNOJENJE..... | 5 |
| 3.1 GNOJENJE Z DUŠIKOM | 5 |
| 3.1.1 Gnojenje rodnih vinogradov z dušikom..... | 6 |
| 3.1.2 Gnojenje mladih vinogradov z dušikom | 7 |
| 3.2 GNOJENJE S FOSFORJEM IN KALIJEM..... | 7 |
| 3.2.1 Založno gnojenje vinogradnih tal..... | 7 |
| 3.2.2 Gnojenje vinogradov s fosforjem in kalijem..... | 7 |
| 4. OSKRBA TAL..... | 8 |
| 4.1 OSKRBA TAL V MEDVRSTNEM PROSTORU | 9 |
| 4.1.1 Oskrba tal pri obnovi vinograda..... | 9 |
| 4.2 OZELENITEV TAL | 9 |
| 4.2.1 Trajna ozelenitev | 10 |
| 4.2.2 Kratkotrajna ozelenitev | 11 |
| 4.3 ZASTIRANJE TAL | 12 |
| 4.3.1 Zastiranje s slamo..... | 13 |
| 4.4 OSKRBA TAL V VRSTI (POD TRTAMI)..... | 13 |
| 4.5 OSKRBA TAL V VINOGRADIH, OKUŽENIH S TRSNO RUMENICO | |
| POČRNELOSTI LESA (fitoplazma Grapevine bois noir) | 15 |
| 5. OBREMENITEV | 16 |
| 6. OSKRBA LISTNE POVRŠINE V VINOGRADIH PO POZEBI..... | 16 |
| 7. REGULIRANJE PRIDELKA – ODSTRANJEVANJE GROZDJA..... | 16 |
| 7.1 SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO ODSTRANJEVANJA GROZDJA ... | 16 |
| 8. INTEGRIRANO VARSTVO VINSKE TRTE..... | 17 |
| 8.1 NAČINI VARSTVA VINSKE TRTE..... | 19 |
| 8.1.1 Mehanični način | 19 |
| 8.1.2 Biotični način | 19 |
| 8.1.3 Biotehniški ukrepi | 19 |
| 8.1.4 Kemični način | 19 |
| 8.2 Opazovalno-napovedovalna služba za varstvo rastlin..... | 20 |
| 8.3 INTEGRIRANO VARSTVO PRED BOLEZNIMI VINSKE TRTE..... | 21 |
| 8.3.1 Peronospora vinske trte (<i>Plasmopara viticola</i>)..... | 21 |
| 8.3.2 Oidij vinske trte (<i>Uncinula necator</i>)..... | 25 |
| 8.3.3 Črna pegavost vinske trte (<i>Phomopsis viticola</i>)..... | 26 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 8.3.4 | Rdeči listni ožig (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)..... | 27 |
| 8.3.5 | Siva grozdna plesen (<i>Botrytis cinerea</i>) | 28 |
| 8.4 | INTEGRIRANO VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE | 29 |
| 8.4.1 | Grozdni sukači (pasasti – <i>Eupoecilia ambiguella</i> , križasti – <i>Lobesia botrana</i>)... | 29 |
| 8.4.2 | Škodljivi škržatki..... | 30 |
| 8.4.3 | Veliki trtni kapar (<i>Neopulvinaria innumerabilis</i>), češpljev kapar (<i>Parthenolecanium corni</i>) in druge vrste kaparjev | 32 |
| 8.4.4 | Sovke (<i>Noctuidae</i>), zemljemerka (<i>Boarmia rhomboidaria</i>), trsni brstar (<i>Theresimima ampelophaga</i>)..... | 32 |
| 8.4.5 | Rdeča sadna pršica (<i>Panonychus ulmi</i>), rumena pršica (<i>Eotetranychus carpini</i>) | 32 |
| 8.4.6 | Trsna kodravost ali akarinoza (povzročitelj <i>Calepitrimerus vitis</i>) in trsna pršica (<i>Colomerus vitis</i>)..... | 33 |
| 8.5 | TEHNIKA ŠKROPLJENJA | 34 |

KAZALO PREGLEDNIC

| | | |
|-----------------|---|----|
| Preglednica 1: | Priporočila za gnojenje z dušikom glede na bujnost rasti trt (kg dušika/ha odprta tla)..... | 6 |
| Preglednica 2: | Priporočena količina hranil v kg/ha za založno gnojenje vinogradov glede na založenost tal..... | 7 |
| Preglednica 3: | Gnojenje s K in P pri stopnji založenosti C (dobro) pri pridelku 5000-10000 kg/ha pri odprtih in ozelenelih tleh..... | 8 |
| Preglednica 4: | Rastline primerne za zeleno gnojenje..... | 11 |
| Preglednica 5: | Travno-deteljne mešanice za trajno ozelenitev na različnih tipih tal:..... | 12 |
| Preglednica 6: | Dovoljeni herbicidi..... | 15 |
| Preglednica 7: | Dovoljeni fungicidi pri zatiranju peronospore – <i>kontaktni fungicidi</i> | 22 |
| Preglednica 8: | Dovoljeni fungicidi pri zatiranju peronospore – sistemični in polsistemični fungicidi..... | 24 |
| Preglednica 9: | Dovoljeni fungicidi pri zatiranju oidija..... | 25 |
| Preglednica 10: | Dovoljeni fungicidi pri zatiranju črne pegavosti..... | 27 |
| Preglednica 11: | Dovoljeni fungicidi pri zatiranju rdečega listnega ožiga..... | 28 |
| Preglednica 12: | Dovoljeni fungicidi pri zatiranju sive grozdne plesni..... | 29 |
| Preglednica 13: | Dovoljeni insekticidi pri zatiranju grozdnih sukačev..... | 30 |
| Preglednica 14: | Dovoljeni insekticidi pri zatiranju ameriškega škržatka..... | 31 |
| Preglednica 15: | Dovoljeni insekticidi pri zatiranju kaparjev..... | 32 |
| Preglednica 16: | Dovoljeni akaricidi..... | 33 |
| Preglednica 17: | Dovoljena fitofarmacevtska sredstva pri zatiranju trsne kodravosti ali akarinoze in trsne pršice..... | 33 |

1. NAJMANJŠA POVRŠINA

Najmanjša površina vključenih vinogradov je 0,5 ha bruto površine. V območjih z večjo razdrobljenostjo – Haloze, Prekmurski vinorodni okoliš, Dolenjska, Bela Krajina in Kras pa je minimalna površina vključenih vinogradov 0,3 ha bruto površine po pridelovalcu.

Pridelovalci, ki ne vlagajo zahtevka za plačilo integrirane pridelave grozdja iz naslova SKOP ali KOP, lahko v kontrolo integrirane pridelave vključijo tudi manjšo površino, kot je navedena v prvem odstavku. V kontrolo pa morajo vključiti vse površine na katerih pridelujejo grozdje.

2. OBVEZNOSTI PRIDELOVALCA VINA ZA ZAGOTOVITEV SLEDLJIVOSTI

Pridelovalec s pridobitvijo certifikata pridobi pravico do označevanja vina z znakom 'integriran', pridobljeno iz integrirano pridelanega grozdja, ki je bil pridelan v letu izdaje potrdila. V kolikor namerava pridelovalec vina, grozdje in vino označevati z znakom 'integriran', mora poskrbeti za ločevanje grozdja in vina pridelovalcev, ki pridelujejo v skladu s pravilnikom o integrirani pridelavi od grozdja in vina ostalih pridelovalcev.

3. GNOJENJE

- **Gnojenje se lahko izvede le na osnovi analiz tal, analizni izvidi morajo ostati v evidenci**
- **Za gnojenje mora biti izdelan gnojilni načrt (pridelovalec ga lahko sestavi sam)**
- **Analiza tal mora biti opravljena vsaj vsakih 5 let, v večjih kompleksih najmanj ena na 10 ha vinograda**
- **Pri rabi kompostov je treba upoštevati morebitno vsebnost težkih kovin (obvezna analiza)**
- **Zagotoviti je potrebno povratni vnos vseh organskih odpadkov v vinograd**
- **Ob daljšem sušnem obdobju in ob izraženih znakih pomanjkanja posameznih hranil lahko uporabimo foliarna gnojila**

Tla morajo trti zagotoviti letno potrebo po hranilih za razvoj mladik, listov in grozdja. Oskrba tal in gnojenje sta kot usmerjevalna in dopolnilna ukrepa. V primerjavi z drugimi kulturnimi rastlinami odzame trta manj hranil. Pri gnojenju z organskimi in mineralnimi gnojili moramo vnašanje hranil dolgoročno prilagoditi načrtovanemu pridelku, pri čemer moramo upoštevati založenost tal in stopnjo mineralizacije dušika. Gnojenje z dušikom zahteva specifično ravnanje. Za hranila fosfor, kalij in magnezij imajo tla večjo sposobnost vezave. Za oskrbo tal s temi hranili je potrebno upoštevati analizo tal.

3.1 GNOJENJE Z DUŠIKOM

- **Maksimalen vnos dušika (čistega hranila) v kg/ha mora biti v skladu z bujnostjo trt in pridelkom, kot je podano v razpredelnici 1.**
- **Maksimalen enkratni vnos dušika (čistega hranila) je 50 kg/ha.**
- **Gnojenje z dušikom se lahko izvaja le v času od fenološke faze B-C do konca junija.**
- **Prepovedano je gnojenje z mineralnim dušikom pred sajenjem.**
- **V času od 30. novembra do 1. februarja je prepovedana uporaba kateregakoli gnojila (tudi organskega), ki vsebuje dušik.**

Glede na vsebnost organske snovi lahko tla več let zagotavljajo dovolj velike količine dušika nastalega pri mineralizaciji. Posebno v sušnih obdobjih, pri nižjih vsebnostih organske snovi (pod 1.5 %), so količine dušika za oskrbo trte premajhne. V teh primerih je potrebno dodati potrebne količine dušika (glej preglednico 1). **Pri pomanjkanju dušika, uvajanju trajne ozelenitve oziroma zelenega gnojenja (podorine) in gnojenja s slamo lahko dodamo ustrezno količino dušika. Npr. pri uvajanju trajne ozelenitve še dodatno do 30 kg/ha.** V vinograd lahko v enem odmerku vnesemo največ 50 kg/ha mineralnega dušika. Z načrtnim rahljanjem pospešujemo mineralizacijo dušika, da ga ima trta dovolj na voljo do cvetenja in v juliju za rast mladik in jagod.

Pri gnojenju z dušikom je primerno vnašati manjše količine dušika (organskega ali mineralnega) od maksimalno dovoljenih. Pomanjkanje dušika na posameznih parcelah ima za posledico slabšo bujnost trt v naslednjih letih.

3.1.1 Gnojenje rodni vinogradov z dušikom

Gnojenje z dušikom v rodni vinogradih se ravna po:

- ravnih razmerah v vinogradu (sorta, starost vinograda, struktura tal),
- vsebnosti organske snovi v tleh,
- zmogljivosti določenih sort na določenih legah,
- vremenskih razmerah,
- sproščanju dušika v tleh, če je obdelava tal izvedena v ustreznem času.

V rodni vinogradih je pomembna ocena bujnosti rasti na osnovi ravnih razmer zadnjih let. Vsebnost organske snovi v tleh in potreba posamezne sorte (pridelek) po dušiku vplivata na celoten razvoj mladik in listja. **Tudi pri gnojenju z organskimi gnojili je potrebno upoštevati vsebnost hranil v tleh.**

Za dušik je pomemben čas gnojenja, ker trta potrebuje večje količine dušika šele proti koncu maja. Zato lahko potrebno gnojenje izvedemo najbolj zgodaj v drugi polovici aprila ali v začetku maja oziroma najprej v fenološki fazi B-C. Če dodajamo dušik v dveh delih, moramo drugega dodati najkasneje konec junija (po cvetenju). Kot oblika gnojila je primerna kombinacija hitro in počasi delujočega dušika.

Preglednica 1: Priporočila za gnojenje z dušikom glede na bujnost rasti trt (kg dušika/ha odprta tla).

| Bujnost trt | Rodnost vinograda | |
|-------------|---|--|
| | nizka pod 5000kg/ha sorte z malimi grozdi | srednja 5000-10000 kg/ha sorte z velikimi grozdi |
| močna | 0-40 | 60 |
| srednja | 50 | 70 |
| slaba | 70 | 80 |

V enem odmerku lahko dodamo največ 50 kg dušika/ha. Ob pomanjkanju dušika, uvajanju trajne ozelenitve oz. zelenega gnojenja, gnojenja s slamo lahko dodamo večjo skupno količino dušika vendar v dveh odmerkih. Pri ozelenitvi tal lahko dodamo še dodatnih 20-30 kg dušika. Količin dodanih hranil s foliarnimi listnimi gnojili pri tem ne upoštevamo.

Formula za izračun količine gnojil:

$$\frac{\text{kg potrebnega hranila na ha}}{\% \text{ hranila v predvidenem gnojilu}} \times 100 = \text{količina gnojila na ha}$$

3.1.2 Gnojenje mladih vinogradov z dušikom

V letu sajenja in naslednjih letih je za dovolj bujno rast trt najpomembnejša oskrba z vodo. Pri dobro založenih tleh ni potrebno prva tri do štiri leta gnojiti z dušikom. Z uvajanjem zelenega gnojenja (in pri slabo založenih tleh) je potrebno dognojiti s tolikšno količino dušika, da rastline za zeleno gnojenje ne predstavljajo konkurence trti. V tleh z malo organske snovi lahko od drugega leta dalje dodajamo manjše količine dušika. V mladih vinogradih ne smemo uporabiti prevelikih odmerkov dušika zaradi premočne rasti, ker ta negativno vpliva pri vzgoji trte. Natančne odmerke dušika je težko predpisati – gibljejo se glede na tla od 0-30 kg/ha čistega dušika. Foliarno gnojenje predstavlja možno dopolnitev v oskrbi s hranili, predvsem v sušnih letih je učinek večji. **Negativnih vplivov suše pa ne moremo kompenzirati z večjimi odmerki dušika.** Z zalivanjem mladih vinogradov ne smemo predolgo odlašati. Po sušnem stresu mladike kljub zalivanju trt nimajo več optimalne rasti.

3.2 GNOJENJE S FOSFORJEM IN KALIJEM

3.2.1 Založno gnojenje vinogradnih tal

Korenine vinske trte so najbolj razvite v globini 30-60 cm. Ker se kalij, zlasti pa fosfor zelo počasi pomikata po profilu tal navzdol moramo pred pripravo novega oziroma obnovo starega vinograda obogatiti celotno rigolno plast zemlje s fosforjem in kalijem. Tla so lahko zaradi prejšnjega založnega ali rednega gnojenja različno založena s hranili. Zato je treba pred napravo novega vinograda nujno dati zemljo v kemično analizo. Glede na založenost tal, ki je razvidna iz izvida analize tal, določimo odmerke P_2O_5 in K_2O za založno gnojenje. V preglednici 2 so odmerki P_2O_5 in K_2O , ki jih je potrebno dodati glede na to, v katero stopnjo oskrbljenosti spadajo tla. Tal, ki po oskrbljenosti spadajo v D- in E-stopnjo ni potrebno gnojiti na zalogo. Pri teh stopnjah oskrbljenosti je izjema le **kalij** in sicer v primeru, ko je založenost tal z magnezijem zelo visoka in je razmerje med kalijem in magnezijem ožje od 2 : 1. V takem primeru kljub visoki oskrbljenosti tal s kalijem še kalij dodamo in sicer enako količino kot pri stopnji C. Na enak način gnojimo tudi pri rednem gnojenju vinogradov. V takih situacijah se je pred gnojenjem priporočljivo posvetovati s strokovnjakom.

Preglednica 2: Priporočena količina hranil v kg/ha za založno gnojenje vinogradov glede na založenost tal

| Stopnja založenosti | P_2O_5 | K_2O glede na tip tal | | |
|---------------------|----------|-------------------------|---------------|-------|
| | | lahka | srednje težka | težka |
| A-zelo nizka | 600 | 600 | 700 | 800 |
| B-nizka | 300 | 300 | 400 | 500 |
| C-zadostna | 150 | 150 | 200 | 250 |

3.2.2 Gnojenje vinogradov s fosforjem in kalijem

- **Gnojenje s fosforjem in kalijem mora biti usklajeno s stopnjo založenosti tal in z letnim odvzemom hranil.**
- **Če je v gnojilu tudi dušik, se ravnamo po zahtevah za gnojenje z dušikom.**

Za razliko od dušika, gnojenje s fosforjem in kalijem ni vezano na določen čas. Glede na njuno slabo gibljivost v tleh jih je najprimerneje dodati v jeseni. Pri trajni ozelenitvi moramo gnojila raztrositi po celi površini. Vnos hranil v nižje plasti tal opravijo tudi rastline za zeleno gnojenje. Ob zadostni založenosti tal (stopnja C) v mladih vinogradih ni potrebno gnojiti, ker je odvzem hranil manjši. Če je določenega hranila po analizi tal veliko (D) oziroma zelo veliko (E) (tudi pri obnovi), moramo za nekaj let opustiti gnojenje s tem hranilom. Ko

založenost posameznega hranila pade na stopnjo C (analiza tal po 5 letih), je potrebno le-tega dodati in to le v količinah, ki jih je trta odvzela z grozdem (glej tabelo). Če je vsebnost kalija in fosforja na stopnji A, moramo vinograd dognojiti do stopnje C. V takem primeru lahko v enem letu dodamo največ trikratno količino letnih potreb vinske trte.

Med zorenjem trta potrebuje več kalija, ki je pomemben za kakovost jagod in dozorelost lesa. V sušnem obdobju se priporoča foliarno gnojenje s kalijem, ker zmanjša potrebo po vodi. Pomanjkanje kalija vpliva na slabšo dozorelost lesa in s tem na manjšo odpornost vinske trte na nizke temperature. Gnojenje s kalijem in fosforjem ni potrebno vsako leto. V letih manjše porabe hranil lahko gnojimo vsako drugo leto. Na apnenih tleh in sušnih območjih moramo dati prednost vodotopnemu fosfatu (superfosfat). Na kislih tleh imajo prednost fosfati, ki vsebujejo kalcij (tomaževa žindra, hiperfosfat).

Preglednica 3: Gnojenje s K in P pri stopnji založenosti C (dobro) pri pridelku 5000-10000 kg/ha pri odprtih in ozelenelih tleh

| Hranilo / pridelek | Odprta tla | Trajna ozelenitev |
|---|------------|-------------------|
| FOSFOR kg P ₂ O ₅ /ha | 30 | 35 |
| KALIJ kg K ₂ O/ha | 70 | 80 |

Enoletni les moramo pustiti v vinogradu. Vračanje hranil iz lesa poteka zelo počasi, količina teh hranil je zelo majhna in ne zagotavlja dovolj velike dodatne oskrbe s fosforjem, predvsem pa ne s kalijem. Stari les in predvsem od škodljivih saprofitskih gliv (*Eutypa* sp., *Phomopsis* sp., ...) napadeni les moramo odstraniti iz vinograda in sežgati. **Gnojenje s temi hranili je generalno prepovedano v času, ko so tla zmrznjena, pokrita s snegom, nasičena z vodo in poplavljena.**

Založenost tal pri stopnji C (mg/100 g tal): P₂O₅ 13-20, K₂O lahka tla 16-25, težka tla 21-30, Mg lahka tla >14, težka tla >17

4. OSKRBA TAL

- Od 1. 11. do fenološke faze B-C se tla v vinogradu ne obdelujejo in morajo biti pokrita s travno rušo ali organsko snovjo, v preostalem letu pa mora biti vsaj polovica površine vinograda ozelenela (na terasah pri nagibu >20 % vsaj zatravljena brežina).
- Sežiganje travne ruše in brežin je prepovedano.
- V pasu pod trtami lahko plevel odstranujemo le mehansko
- Če ukrepi mehanskega odstranjevanja plevelov ne zadostujejo, lahko uporabimo po IPG smernicah dovoljene herbicide (glej poglavje varstvo vinske trte)
- V pasu pod trtami ali točkovno lahko tretiramo s herbicidi (glej preglednico 5). Širina tretiranega pasu pod trtami je lahko največ 25 % neto površine vinograda.

Načini oskrbe tal skupaj z gnojenjem imajo cilj, da ohranijo specifične lastnosti tal določenega območja. To niso togi sistemi, saj so lahko kombinirani glede na naravne značilnosti kraja in obrata. Z oskrbo tal lahko posegamo v talni sistem zavirajoče ali pospešujoče, da bi tako čim manj vplivali na naravne procese v tleh.

Izjemoma se dovoli pridelovalcem v vinorodnem okolišju Kras, da pustijo površino medvrstnega prostora od 15.4. do 1.11. neozelenelo, kadar tla ne omogočajo rasti travni ruši zaradi prevelikega deleža skeleta.

4.1 OSKRBA TAL V MEDVRSTNEM PROSTORU

Stalno mehansko obdelovanje tal preko vsega leta je prepovedano. Tla smejo biti obdelana le za kratek čas v določenih okoliščinah (suša – vsaka druga vrsta). Načini oskrbe tal v integrirani pridelavi grozdja so:

- trajna ozelenitev (setev travno-deteljnih mešanic ali naravna ozelenitev, kjer gre za kontroliran razvoj plevelov oziroma travne ruše);
- kratkotrajna ozelenitev (podorine; s setvijo ali naravna);
- obdelava tal (grobo rahljanje tal v vsaki drugi vrsti);
- pokrivanje tal (slama, lubje) in
- kombinacije prej naštetih (vsaka druga vrsta).

Tla v medvrstnem prostor morajo biti od 1. novembra do fenološke faze vinske trte B-C zatravljena ali ustrezno pokrita (slama ali naravna ozelenitev ali kratkotrajna ozelenitev). Možna je tudi kombinacija ozelenitve vsake druge vrste in ustreznega pokritja ostalega dela (slama).

Pri vinogradih na terasah nad 20 % strmine zadostuje, da je v času rasti trte pokrita oziroma zatravljena samo brežina. Poleg običajne nege travne ruše (mulčenje, košnja, valjanje – odvisno od padavin) lahko od fenološke faze B-C do 31. maja (Primorska fenološke faze B-C – 31.10.) tla tudi plitvo obdelujemo (kultiviramo, podrahljamo), pri čemer moramo ohraniti grobo strukturo tal. S tem ukrepom prizadenemo del korenin travne ruše in tako zmanjšamo porabo vode. Hkrati se s tem ukrepom izboljša mineralizacija dušika in poveča se sprejem vode v tla. Pri rahljanju postopamo tako, da so tla čim manj podvržena eroziji in da jih pri tem nismo preorali. Prepovedano je tla obdelovati s frezo.

Ozelenitev je potrebno izvesti tako, da takoj po pripravi tal posejemo semena za obnovo travne ruše. Ob tem pridelovalec lahko tla tudi pokrije s slamo oziroma slamo plitvo zadela v tla.

4.1.1 Oskrba tal pri obnovi vinograda

Če pridelovalec izkrči vinograd in zemljišče v naslednjem letu ponovno zasadi, mora tla preko zime zavarovati pred erozijo. Ob sajenju vinograda mora biti oskrba tal v medvrstnem prostoru enaka kot v rodnem vinogradu. Zato je v mladem vinogradu, v primeru ozelenitve, potrebno držati nizko travno rušo (če tla niso pokrita s slamo), v primeru obdelave pa grobo strukturo tal. Plevela lahko pridelovalec zatira v pasu pod trtami. Širina tega pasu je lahko največ 25 % neto površine vinograda (varovanje listov trte je potrebno).

4.2 OZELENITEV TAL

Ozelenitev tal je najprimernejši način oskrbe tal v integrirani pridelavi grozdja. Je najcenejša alternativa ustaljeni oskrbi tal (obdelavi). V sušnih letih lahko povzroči zmanjšanje pridelka, vendar lahko s pravočasnim mulčenjem travne ruše konkurenco za vodo v veliki meri zmanjšamo. Kjer trajna ozelenitev ni mogoča, mnogi vinogradniki izkoriščajo prednosti začasne ozelenitve spomladi ali preko zime (manjša konkurenca za vodo in vezanje dušika v biomaso). Ozelenitev vinogradnih tal (trajna ali začasna ozelenitev ali podorine) je v bistvu spremenjen način zatiranja plevelov in gnojenja z organskimi gnojili.

Ozelenitev tal je za vinogradnika velikokrat zanimiva šele takrat, ko se zaradi neustrezne obdelave, struktura tal toliko poslabša, da začne neprepustnost tal ovirati razvoj trte tudi v globljih plasteh tal. V teh plasteh skušamo s podorinami ali ozelenitvijo povečati količino organske snovi in tako izboljšati prepustnost tal za zrak in vodo. Pri ozelenitvi se življenje v

tleh bistveno spremeni, mikroorganizmi se bolj razmnožijo, na stalno obdelovanih tleh pa je število vrst in absolutno število mikroorganizmov močno zmanjšano. Podoben pomen, glede življenja v tleh in obogatitve tal z organsko snovjo, kot ga ima ozelenitev tal (podorine, trajna in začasna ozelenitev vinogradnih tal), ima tudi hlevski gnoj in druga organska gnojila (slama, šota, rožje, kompost, itd.). Razlika je le v tem, da so ti učinki bolj izraziti le v zgornji obdelovani plasti tal.

Z ozelenitvijo postanejo rastline koristne za oskrbo in obogatitev tal z organsko snovjo. Izgube hranil zaradi izpiranja se v veliki meri zmanjšajo. V času, ko trta sprejema malo ali nič hranil, ostale rastline učinkovito biološko konzervirajo hranila in ustvarijo življenjski prostor za raznoliko življenje v tleh. V takih tleh je tudi veliko deževnikov. Poleg tega ozelenitev na tleh z nedostopnimi zalogami fosfatov poveča dostopnost le-teh za trto. Za ozelenitev posejemo eno- ali dveletne rastline v vsako ali vsako drugo vrsto ob hkratni kombinaciji drugega načina pokrivanja tal ali z rahljanjem tal v sušnih območjih (vsaka druga vrsta). Ozelenitev tal lahko dosežemo s setvijo ali po naravni poti (kontroliran razvoj plevelov).

Lastnosti travne ruše pri ozelenitvi tal morajo biti naslednje:

- ne sme ovirati rasti in razvoja trt,
- v sušnih letih ali v območjih z malo padavinami ne sme konkurirati trtam za vodo,
- mora pri močnem razvoju travne ruše le ta ostati nizka,
- travna ruša mora imeti dobro regeneracijsko sposobnost (mulčenje),
- travna ruša mora razviti veliko maso korenin.

4.2.1 Trajna ozelenitev

Pri trajni ozelenitvi gre za košnjo travne ruše, pri čemer vso zeleno maso pustimo v vinogradu. Pestrost travne ruše v trajni ozelenitvi je ekološko najbolj sprejemljiv način oskrbe tal, ki povečuje godnost tal.

V vinorodnih okoliših Slovenije z malo padavinami je potrebno oskrbo tal prilagoditi naravnim razmeram (rahljanje tal v vsaki drugi vrsti).

Pogoji za uvajanje trajne ozelenitve so:

- globoka tla z majhnim deležem grobih delcev (velika kapaciteta tal za vodo),
- vsebnost organske mase mora biti najmanj 1,5 %,
- primerna bujnost trt,
- enakomerna razporeditev padavin v dobi rasti,
- povprečna količina padavin v dobi rasti mora biti najmanj 250-300 mm (maj-oktober).

Ti pogoji niso vedno zagotovljeni, zato je izvedbo trajne ozelenitve potrebno prilagoditi pogojem posameznih okolij. Faza prilagajanja traja običajno 4-6 let. V tem času se travna ruša za trajno ozelenitev strne in hkrati se trte prilagodijo konkurenci.

Dovoljena je izjema v mladih vinogradih do 4. leta starosti, ko v času vegetacije tla lahko plitvo obdelujemo.

Za izboljšanje oskrbe trt z dušikom tla v času od konca aprila do začetka maja po potrebi grobo zrahljamo (rahljalnik za tla s trajno ozelenitvijo). S tem se poraba vode zmanjša in pospeši mineralizacija. V območjih z veliko količino padavin rahljamo pozneje ali sploh ne. Tal do konca maja ne smemo obdelati, ne da bi hkrati posejali semena rastlin za vzgojo trajne travne ruše oziroma za podorine (zeleno gnojenje) ali pa pokrili tla s slamo ali celo slamo plitvo zaorali, da ne bi bila mineralizacija prevelika. Sproščene količine dušika lahko vplivajo na pregnojenost z dušikom. To pa lahko pospeši razvoj bolezni.

4.2.2 Kratkotrajna ozelenitev

Za kratkotrajno ozelenitev je značilno menjavanje obdelave tal in setve rastlin, ki hitro rastejo in dajejo veliko zelene mase (preglednica 5). Kratkotrajna ozelenitev je lahko tudi naravna za krajše obdobje. Kratkotrajno ozelenitev izvajamo:

- ko je oskrba tal z vodo nezadostna,
- v mladih vinogradih kot priprava za trajno ozelenitev ali
- v kombinaciji s trajno ozelenitvijo ali obdelavo ali pokrivanjem tal v vsaki drugi vrsti.

Kratkotrajno ozelenitev izvajamo:

- **v jeseni;** jesenska kratkotrajna ozelenitev je uspešna po trgatvi z rastlinami, ki so odporne proti mrazu. Kalitev semen v jeseni in rast teh rastlin izkoristi jesensko vlago in spomladi začnejo rasti hitreje in močnejše. Zeleni pokrov še izkoristi jesenske količine dušika v tleh in s tem zmanjša tudi izpiranje.
- **zgodaj spomladi;** zgodnja spomladanska kratkotrajna ozelenitev je v kombinaciji z rahljanjem primerna za odpravo slabe strukture tal oziroma škode na strukturi tal. Z rahljanjem preprečimo zbitost tal mehansko, korenine rastlin začasne ozelenitve pa to stanje stabilizirajo. Glede na količino vode v tleh, lahko ozelenimo samo vsako drugo vrsto. Rastline za začasno ozelenitev moramo zmulčiti pri višini okrog 50 cm (prehajajo ali pa so že v fazi cvetenja), vendar najpozneje 14 dni pred cvetenjem trte. Ozelenitev prilagodimo vremenskim razmeram, tlom in oskrbi z vodo. V vlažnih letih lahko rastline že cvetijo preden jih zmulčimo.
- **proti koncu poletja;** poletna kratkotrajna ozelenitev je najprimernejša v času zaključka rasti mladik trte, t.j. od začetka do sredine avgusta. V sušnih območjih je to včasih prezgodaj za kalitev semen, saj je oskrba z vodo nezadostna. Z izhlapevanjem vode (transpiracijo) iz rastlin za začasno ozelenitev se v vrstah temperatura zmanjša, poveča pa se relativna zračna vlaga. To lahko poveča okužbo s sivo plesnijo (botritisom) in zmanjša kakovost grozdja.
- **kratkotrajna naravna ozelenitev v jeseni;** pri tem načinu oskrbe tal gre za razvoj trav in plevelov, ki so značilni za posamezen tip tal. Zaželena je čim večja pestrost zelenega pokrova. Glede na sestavo trav in plevelov je razvoj travne ruše pri naravni ozelenitvi zelo različen. Na območjih, kjer je padavin več, je naravni način ozelenitve uspešnejši kot na območjih z malo padavinami. Zato na sušnih območjih pokritost tal in dober razvoj rastlin lažje dosežemo s setvijo. Za hitrejšo pokritost tal v celoti, lahko nepokrite dele rastišča posejemo z ustreznimi travnimi mešanici. Pri naravni ozelenitvi jeseni, od sredine avgusta naprej, tla mehansko več ne obdelujemo in pleveli ter trave se prosto razvijejo. Tako ostanejo tla preko zime vsaj delno pokrita. Spomladi plevela uničimo z obdelavo ali mulčenjem.

Preglednica 4: Rastline primerne za zeleno gnojenje

| Ime | količina semena (kg/ha) | čas setve | opombe |
|----------------|-------------------------|-----------|--|
| krmni grah | 100-130 | P | veže dušik |
| grah za zrnje | 120-150 | P | veže dušik |
| jara grašica | 80-120 | P | veže dušik |
| ozimna grašica | 80-120 | J | veže dušik |
| facelia | 6-10 | P | prenaša senco, hitra razrast, plitve korenine, privablja čebele (paziti pri škropljenju), dobro prenaša sušo, nezahtevna |
| soja | 60-80 | P | občutljiva na mraz – zato kasnejša setev, veže dušik |
| lupina | 100-150 | P,J | globoke korenine, dobra za lahka tla z manj apna, veže dušik |

...nadaljevanje na naslednji strani

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| ozimna ogrščica | 10-15 | J | hitra in močna rast, nevarnost divjadi, nevarnost ogorčic (nematod) se poveča |
| jara krmna ogrščica | 10-15 | P | glej ozimno grašico |
| krmna redkev | 15-20 | P | globoke korenine, močna razrast; porabi vodo iz globljih slojev, preprečuje razvoj plevelov, ne prezimi |
| ozimna repica sorta Perko | 10-15 | P,J | dober podsevek, dobra rast |
| ozimna krmna ogrščica | 10-15 | P,J | podobno kot ozimna ogrščica – več koreninske in listne mase |
| koruza | 40-60 | P | občutljiva na mraz, porabi dosti vode |
| oves | 100-150 | P | velika poraba vode |
| ozimna pšenica, ozimna rž | 120-150 | P,J | dobro se kosi, slama pokrije in zaščiti tla pred erozijo, pri spomladanski setvi ni klasov, rabi dosti vode – pravočasno mulčenje |
| sončnica | 10-20 | P | ob cvetenju rabi veliko vode, možna zgodnja setev |
| ozimni ječmen | 120-150 | P | zraste hitro, dober za pokritost tal, malo zelene mase, dobra zaščita pred erozijo |
| mešanice za setev | | | |
| ozimna pšenica ali ozimni ječmen/ ozimna grašica | 100/50 | J | dober podsevek, večkratno mulčenje možno, |
| sončnica/ jara grašica | 10/50 | P | velik porabnik vode (sončnica), možna zgodnja setev (marec) |
| koruza/krmna grah | 40/80 | P | koruza občutljiva za mraz – ne prezgodaj |
| specialne mešanice | 10 | P | 30 % aleksandrijska detelja 50 % bela gorjušica 20 % facelia |
| | 40-50 | P,J | za dvoletno zeleno gnojenje, večkrat kosna ozimna grašica, inkarnatka, italijanska ljuljka |
| P – pomlad, J – jesen | | | |
| Rastline, ki vežejo dušik, prinesejo 10-40 kg N/ha/leto | | | |

Preglednica 5: Travno-deteljne mešanice za trajno ozelenitev na različnih tipih tal:

| Za vsa rastišča | Za bolj plitka in sušna tla | Za kamnita tla z več skeleta |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20 % trpežna ljuljka | 10 % trpežna ljuljka | 15 % ovčja bilnica |
| 30 % rdeča bilnica | 30 % rdeča bilnica | 30 % rdeča bilnica |
| 10 % ovčja bilnica | 10 % ovčja bilnica | 40 % travniška latovka |
| 30 % travniška latovka | 20 % travniška latovka | 15 % lasasta šopulja |
| 5 % plazeča šopulja | 20 % navadna latovka | |
| 5 % bela detelja | 10 % lasasta šopulja | |
| Količina semena 50 kg/ha | Količina semena 60 kg/ha | Količina semena 80 kg/ha |

Opombe:

- za hitro ozelenitev tal lahko pri vseh mešanicah dodamo oves, v manj sušnih območjih pa še mnogocvetno ljuljko
- bilnice so manj primerne za ročno košnjo
- na večjih strminah v mešanici naj ne bo metuljnic zaradi zdrsa traktorskih koles

4.3 ZASTIRANJE TAL

S pomočjo različnih neoporečnih organskih snovi (slama, skorja, lesni sekanci)) tla pokrijemo. Po enem do treh letih površinsko plast vdelamo v tla in tla na novo zastremo.

4.3.1 Zastiranje s slamo

Medvrstne prostore pokrijemo s 50-100 dt slame na ha. Za pokrivanje tal s slamo so potrebni posebni stroji, lahko pa to naredimo tudi ročno. Pomembno je, da je slama dobro razporejena po površini in dovolj kratko narezana.

Slama vsebuje veliko ogljika in malo dušika, tako je C : N razmerje veliko (80-100 : 1). Za dobro mikrobiološko aktivnost in razgradnjo slame so potrebne dodatne količine dušika. Pri tleh z malo dušika je potrebno dodatno gnojenje z dušikom. Za vsakih 100 kilogramov slame je potrebno dodati cca. 1 kg dušika (4 kg KAN-a).

Zastiranje s slamo preprečuje evaporacijo in je zato koristen način oskrbe tal za vinogradniška območja z malo padavinami in lege z lahkimi tlemi in malo kapaciteto tal za vodo.

4.4 OSKRBA TAL V VRSTI (POD TRTAMI)

Dovoljeni so le herbicidi s seznama v preglednici 6.

Raba herbicidov je dovoljena le v vrsti v pasu do 25 % neto površine vinograda.

Podrast v vrsti lahko reduciramo mehansko (košnja, obdelava) ali s herbicidi. Herbicidi pri integriranem pridelovanju grozdja niso preveč zaželeni. Nego tal lahko le delno in omejeno dopolnjujejo, ne morejo pa je nadomestiti. Smotrna in strokovna raba herbicidov je zato lahko le koristen dopolnilni ukrep pri sodobni negi tal v vinogradu. Pri večletni uporabi herbicidov, še posebej na celotni površini, kar je v vinogradništvu le izjemoma potrebno, se dinamika življenja v tleh bistveno spremeni. Značilno se zmanjša število deževnikov v zgornji plasti tal (10-20 cm). Tisti, ki ostanejo se v glavnem preselijo v globlje plasti tal (30-40 cm). Pogosto se na tretirani površini sčasoma namnožijo plevelne vrste, ki so na uporabljene herbicide odpornejše ali povsem odporne in v izhodiščni podrasti niso predstavljali večjih težav. Širina herbicidnega pasu ne sme presegati 25 % neto površine vinograda. Na primer v vinogradu, kjer je medvrstna razdalja 2 m je širina herbicidnega pasu lahko največ 50 cm.

S pripravkom na podlagi MCPA zatiramo širokolistne vrste plevela (predvsem slak in koprive), ki so pomembni gostitelji fitoplazme in s tem obilen vir okužbe za vinsko trto. Zaradi nevarnosti poškodb vinske trte (fitotoksičnosti) tega herbicida ne smemo uporabljati v času cvetenja vinske trte in pri temperaturah nad 25 ° C. V času tretiranja mora biti ozračje povsem mirno. Škropimo z nizkim pritiskom (0,5 do 1,0 bara), da ni zanašanja škropiva in prevelikega sproščanja hlapov. Uporabo MCPA uskladimo s košnjo in mulčenjem. Ob uporabi morajo pleveli bujno rasti in imeti morajo čim večjo aktivno listno površino. Najbolje je, da trajne ledine pred prvim škropljenjem še ne pokosimo, med morebitno drugo aplikacijo in košnjo pa mora preteči vsaj 14 dni časa. U 46 M-fluid se sme uporabljati le enkrat letno! Oskrba tal v vrsti je usmerjena v zaviranje razvoja močno rastočih plevelov in trav. Cilj oskrbe je usmerjanje razvoja plevelov in trav in ne uničevanje zelenega pokrova. Uporabimo lahko le herbicide, ki so navedeni v smernicah za integrirano varstvo vinogradov.

Če ni drugače navedeno, je uporaba herbicidov dovoljena le do 15. julija (izjema so vinogradi, kjer se pojavljajo rumenice). Dovoljeno je jesensko tretiranje s herbicidi na osnovi glifosata in glifosata v obliki amonijeve soli, pri čemer je potrebno upoštevati najvišji letni dovoljen nanos herbicidov naveden v preglednici št. 6. Prednost jesenske uporabe je v boljšem delovanju herbicidov še posebej na nekatere lesnate vrste plevelov (robida, robinija, bršljan, srobot, ipd.), zaradi pretakanja sokov v smeri korenin, zato je mogoče herbicide uporabiti tudi v polovičnem odmerku. Jesensko tretiranje je treba opraviti po trgatvi, vendar najpozneje do sredine novembra. Herbicidom je priporočljivo dodajati močila skladno s strokovnimi navodili, saj s tem lahko značilno povečamo učinkovitost. Vrste dovoljenih močil in drugih dodatkov v navodilih ne navajamo posebej, ker te snovi za enkrat še ne obravnavamo, kot ekološko problematične. O vrsti dodanih močil se vinogradnik odloča sam,

glede na strokovna navodila pri posameznih herbicidnih pripravkih. Pri herbicidu GOAL dovoljemo uporabo v skladu z navodili za uporabo, kjer je predvideno tudi dodajanje manjših količin tega herbicida herbicidom na podlagi glifosata, da povečamo učinkovitost delovanja proti slaku, koprivam, preslici, regačici in drugim trdovratnim plevelom. Ta pa ne pomeni, da smemo herbicid GOAL uporabljati v polnem odmerku v poletnem času.

4.5 OSKRBA TAL V VINOGRADIH, OKUŽENIH S TRSNO RUMENICO POČRNELOSTI LESA (FITOPLAZMA GRAPEVINE BOIS NOIR)

Pogosto košena negovana ledina, v kateri prevladujejo trave, je najboljši sistem za preprečevanje razvoja plevelov, ki so gostitelji fitoplazme (npr. koprive, slak, poprovník, pasje zelišče, ...). Tisti, ki imajo primerne terene, naravne danosti in mehanizacijo, in želijo vztrajati pri gojenju občutljivih sort (npr. Chardonnay), morajo s setvijo ustreznih travnih mešanic poskrbeti, da ima negovana ledina ustrezno sestavo brez prisotnosti plevelov, gostiteljev fitoplazme.

V vinogradih z več kot 5% stopnjo okužbe s trsno rumenico počrnelosti lesa (povzročitelj fitoplazma *Grapevine bois noir*) lahko vinogradniki izvedejo posebne ukrepe za mehansko ali kemično zatiranje plevelov tudi v medvrstnem prostoru, da bi z njimi omejili razširjanje rumenice.

V takšnih vinogradih so dovoljena naslednja odstopanja od pravil:

- medvrstni prostor in prostor pod trtami lahko večkrat letno obdela mehansko, tako da se v njem ne razvija travno zeliščna ruša
- herbicide na podlagi MCPA sme uporabiti le enkrat letno. Herbicide na podlagi glifosata in glufosinina sme uporabiti večkrat letno, če je to skladno z omejitvami navedenimi v registraciji.
- vinogradnik lahko vse dovoljene herbicide uporabi po vsej površini vinograda

Preglednica 6: Dovoljeni herbicidi

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (L/ha) ** | Karenca (dni) | Opombe |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|---|
| glifosat | Boom efekt Dominator ultra 360 SL Roundup ultra Roundup energy Roundup | 3-7* | 35 | Višji odmerek predstavlja tudi največjo dovoljeno skupno letno količino, če pripravek uporabimo v več deljenih odmerkih. |
| Glifosat v obliki amonijeve soli | Touchdown System 4 | 2-8 | 35 | Višji odmerek predstavlja tudi največjo dovoljeno skupno letno količino, če pripravek uporabimo v več deljenih odmerkih. |
| Glufosinat-amonijeva sol | Basta 15 | 4,5-7,5 | 21 | Najbolj se obnese dvakratna uporaba v količini 5 L/ha. Največja dovoljena letna količina je 10 L/ha. |
| MCPA | U 46 M-fluid | 1,5 | Zagotovljena s časom uporabe | Največ 1 krat v rastni dobi, za zatiranje širokolistnega plevela, ko je ta v bujni rasti. Uporaba NI dovoljena v času cvetenja vinske trte in pri temperaturi višji od 25 °C. |
| oksifluorfen | Goal | 3-4,0 | Zagotovljena s časom uporabe | Dovoljena enkratna uporaba do začetka brstenja v vinogradih starejših od 4 let. |
| pendimetalin | Stomp 400 SC | 3,0 | Zagotovljena s časom uporabe | Največ 1 krat v rastni dobi, za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela |

* Odmerek je odvisen od prevladujoče vrste plevela v času tretiranja.

** Odmerek se nanaša na hektar tretirane površine (ne vinograda!)

Primer: Če uporabimo pripravek na osnovi glifosata v odmerku 6,0 l/ha vinograda, to pomeni, da se uporabi na tretirano površino (herbicidni pas) samo 1,5 l.

5. OBREMENITEV

Število mladik ne sme presegati 20 na tekoči meter vrste.

V vinogradih kjer je močna rast mladik, moramo daljše mladike skrajšati (vršičkati). Ta ukrep je uspešen preden se mladike nagnejo preko zadnjega para žic na eno stran. S tem zgodnjim vršičkanjem (sredina junija do konec julija) zmanjšamo nevarnost okužb z boleznimi in zmanjšamo zasenčevanje. S tem vzpodbudimo pravočasno rast zalistnikov, da so ti asimilacijsko aktivni že od sredine avgusta naprej in poveča se skupna neto-asimilacija. Pri prepozneem vršičkanju se listna površina zalistnikov premalo razvije in ne pride do prej omenjene povečane asimilacijske aktivnosti.

V tem času je zelo pomembno, da so mladike dobro razporejene med žice, da je zagotovljena optimalna osvetlitev. To zagotavlja poleg dobre osvetlitve tudi boljšo odpornost trte proti boleznim in olajša aplikacijo sredstev za varstvo vinske trte.

Število vseh mladik med žicami ne sme presegati 20 (še bolje 15) na tekoči meter. Če je mladik več pride do zgostitve listov in poslabšanja razmer za asimilacijo. Razporeditev mladik je pomembna zato, da vse mladike lahko razvijejo v povprečju 12-14 listov/mladiko, kar je približno od 1,2-1,4 m dolžine, ne da bi se pri tem povesele preko zadnjega para žice.

6. OSKRBA LISTNE POVRŠINE V VINOGRADIH PO POZEBI

Pri pozni spomladanski pozebi, odvisno od stopnje pozebe, je plevel potrebno prilagoditi. Več očeš je bilo poškodovanih, več je potrebno pustiti jalovk in mladik iz sobrstov, da se razvije dovolj listne površine v vegetaciji. V takih primerih je potrebno posebno pozornost nameniti varstvu trte pred peronosporo in oidijem, ker so mladike bližje tlim bolj občutljive na bolezni in les na takih trtah slabše dozoreva.

Pri manjših poškodbah zaradi pozebe moramo biti previdni, ker je lahko prišlo do poškodb na eno in večletnem lesu. Te poškodbe se ne pokažejo takoj v prvem letu, pokažejo se lahko v naslednjih letih, celo z odmiranjem trt. V tem primeru so še posebej v nevarnosti mladi vinogradi (sorte občutljive na pozebo, vinogradi na izpostavljenih legah). V takih vinogradih pletve ne opravimo prezgodaj in pazimo na vse mladike.

7. REGULIRANJE PRIDELKA – ODSTRANJEVANJE GROZDJA

Pri velikem nastavku grozdja, če hočemo doseči večjo kakovost, ne smemo pozabiti na zmanjšanje števila grozdov po cvetenju. Pri tem ukrepu bodo imeli pomembno vlogo tudi predpisi za omejitve pridelka.

7.1 SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO ODSTRANJEVANJA GROZDJA

- **grozdje odstranjujemo sočasno z zelenimi deli (odstranjevanje mladik in listov),**
- **občutno povečanje sladkorja je poleg vremenskih razmer, sorte in lege v prvi vrsti odvisno od odstranjevanja grozdja pri prevelikem nastavku,**
- **za zagotovitev kakovosti moramo odstraniti grozdje predvsem pri močno rastočih in zelo rodnih sortah na globokih tleh ter pri velikem nastavku,**
- **če moramo posamezne grozde odstraniti, odstranimo zgornje ali slabše razvite,**
- **ostali grozdi morajo imeti ugodne pozicije za razvoj – dobra osvetlitev,**
- **zgodnje redčenje grozdov (sredi julija) vpliva na izboljšanje rasti razmer in v vinogradih z optimalno rastjo se pridelok v glavnem poveča zaradi večje mase jagod in grozdov. Če je odstranjen en grozd z mladike, je izravnava pridelka**

posebno izrazita, če opravimo redčenje bolj zgodaj. Poveča se tudi kakovost grozdja,

- če zaradi tveganja nismo grozdja razredčili v celoti, lahko to naredimo še enkrat v začetku dozorevanja grozdja, ko odstranimo grozde, ki slabo zorijo.

Redčenje grozdov opravimo v naslednjih pogojih:

- pri zelo rodnih sortah,
- pri velikem nastavku grozdja,
- v poznih letih (če se zavleče cvetenje),
- na slabših legah,
- na globokih, rodovitnih tleh,
- v mladih vinogradih,
- pri močni suši.

8. INTEGRIRANO VARSTVO VINSKE TRTE

- Uporabljena so le fitofarmacevtska sredstva s seznama v teh tehnoloških navodilih ali fitofarmacevtska sredstva ali drugi pripravki, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo;
- Vnos fitofarmacevtskih sredstev mora odgovarjati maksimalno predpisanemu številu tretiranj glede na pripravek;
- Odmerki fitofarmacevtskih sredstev ne smejo presegati priporočenih vrednosti;
- Upoštevane morajo biti karence pripravkov;
- Količina vnesenega bakra ne sme presegati 6 kg/ha/letno;
- Naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev morajo biti testirane;
- Zagotoviti je potrebno povratni vnos vseh organskih odpadkov nazaj v vinograd, razen starega lesa ali če je les močno okužen s črno pegavostjo vinske trte (*Phomopsis viticola*) in drugimi nevarnimi glivami npr. kapjo vinske trte (*Eutypa lata*). Tak les odstranimo iz vinograda in ga zažgemo.

V integriranem ali okolju prijaznem vinogradništvu ima prav varstvo vinske trte še poseben pomen. Pri tem gre za uravnoteženje gospodarskih, ekoloških in kemičnih postopkov in na tak način zadržati škodljive organizme pod pragom škodljivosti. Cilj sodobnega varstva vinske trte je predvsem ohranjanje zdravja vinske trte in tal, ki ga lahko dosežemo z okolju prijaznimi ukrepi, kot so izbira ustreznega rastišča in lege, izbira ustrezne podlage in klonov, usklajeno gnojenje (še posebej z dušikom), odstranjevanje listja iz območja grozdja za doseg dobre prezračenosti in šele po resnični potrebi uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Nenehno moramo stremeti za tem, da s trajno ozelenitvijo vinogradov ustvarimo raznolik ekosistem, ki omogoča preživetje čim večjemu številu rastlinskih in živalskih vrst.

V integriranem varstvu uporaba kemičnih sredstev ni prepovedana, vendar so kriteriji pri njihovi izbiri in uporabi zelo strogi. Fitofarmacevtska sredstva uporabimo šele, ko smo izčrpali druge možnosti in ko so škodljivi organizmi presegli t.im. prag škodljivosti, kar velja predvsem za škodljivce. Pri glivičnih boleznih pragov škodljivosti večinoma ni mogoče postaviti, nujno pa je paziti na izbiro fungicidov in na njihovo uporabo, tako da upoštevamo napotke prognostične službe in da zmanjšamo število škropljenj na najmanjšo možno mero. Izbiramo taka kemična sredstva, ki imajo čimmanj neželenih stranskih učinkov na koristne organizme, predvsem na naravne sovražnike škodljivcev vinske trte.

Uporaba FFS, ki jim v letu pridelave poteče registracijsko dovoljenje in FFS, ki se na novo pojavijo na trgu

Pridelovalci vključeni v sistem integrirane pridelave grozdja smejo uporabljati le pripravke, ki so navedeni v tehnoloških navodilih. V tehnološka navodila se smejo vnesti le pripravki, ki so v času izdaje tehnoloških navodil (mesec december) registrirani v Republiki Sloveniji za predvideno uporabo. Sredstva, ki so navedena v tehnoloških navodilih in jim med letom poteče registracija, pridelovalec lahko uporablja do zaključka rastne dobe, razen v primeru, če drugače ne odredi Fitosanitarna uprava RS (v preglednicah označeno z *). Skladno z določili Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l. RS, št. 2/2004, 37/2004, 98/2004, 14/2007, 35/2007) in pravilnika o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije (Ur. RS 59/2003 in Ur. RS 6/2005) smejo ponudniki FFS sredstva tržiti še največ 18 mesecev po preteku veljavnosti odločbe o registraciji, če pristojni organ Ministrstva za kmetijstvo ne odredi krajšega časovnega obdobja, kar pomeni, da jih v tem obdobju pridelovalci tudi smejo uporabljati. To določilo je v veljavi za pridelovalce, ki pridelujejo v konvencionalnem pridelovanju in tudi za tiste, ki so vključeni v integrirano pridelavo. Selekcijo pripravkov, ki jim je potekla registracija pred izdajo vsakoletnih novih tehnoloških navodil, in se še smejo uporabljati v integrirani pridelavi z namenom, da se porabijo zaloge, opravi Fitosanitarna uprava RS po predlogu strokovne skupine za IPG (v preglednicah označeno z **).

Zaradi zapletenosti postopkov usklajevanja registracijskega statusa pripravkov in postopkov za presojo njihove sprejemljivosti v sistemu integrirane pridelave grozdja (IPG) se bo v bodoče usklajevanje opravilo le enkrat letno v mesecu oktobru in novembru.

Vse nove pripravke, ki se bodo na trgu pojavili po izdaji vsakoletnih tehnoloških navodil v mesecu decembru, bodo pridelovalci smeli uporabljati, četudi ne bodo zavedeni v tabelah v tehnoloških navodilih. Pred vsakoletno izdajo revidiranih tehnoloških navodil za naslednje leto se bodo člani strokovne skupine odločili o vpisu le teh pripravkov v preglednice tehnoloških navodil. Če nekega pripravka zaradi strokovnih zadržkov ne bodo vpisali, se v sistemu IPG v naslednjem letu (drugo leto po registraciji sredstva) ne bo smel uporabljati.

Enako načelo velja za pripravke, ki jim prav v času vsakoletnega revidiranja tehnoloških navodil poteče registracija ali rok za odprodajo zalog po preteku registracije, registracija pa se jim v teku rastne dobe znova podaljša zaradi obnovljenih registracijskih postopkov.

Obvladovanje pojavov zanašanja – drifta FFS

V skladu s pravilnikom o dolžnostih uporabnikov, kakor tudi s splošnimi načeli dobre kmetijske prakse, je uporabnik FFS tretiranje dolžan izvajati tako, da sredstva ne zanaša na sosednje površine. Ker je v praksi to težko izvedljivo morajo pridelovalci dovolj premišljeno izvajati škropljenje in izbirati primerne površine za gojenje vinske trte tudi z vidika možnosti zanašanja FFS. Pridelovalec je pred izbiro vinograda dolžan presoditi možnosti za pojave zanašanja. V pomoč so lahko različne varnostne meje ali pregrade. Če za pridelovanje vinske trte izbere površino, kjer so možnosti za pojave zanašanja s sosednjih površin velike, mora prevzeti tveganje nase. Kontrolne organizacije ne morejo dovoljevati ostankov nedovoljenih FFS v pridelkih, ne glede na to, ali so posledica zanašanja FFS iz okolice, ali lastne nepravilne uporabe.

8.1 NAČINI VARSTVA VINSKE TRTE

8.1.1 Mehanični način

Kadar je le mogoče, preprečujemo širjenje okužb mehanično, kakor npr. z izrezovanjem rakastih tvorb, okuženih rozg in mladik, z odstranjevanjem in uničenjem porezanega lesa in podobno. Pravzaprav sodi sem tudi odstranjevanje listja z območja grozdja, s čimer zmanjšujemo možnost okužb s sivo grozdno plesnijo.

8.1.2 Biotični način

V okolju prijaznem vinogradništvu je pomembno varovanje in pospeševanje pojava in razvoja koristnih živalskih vrst in po potrebi tudi njihovo vnašanje v vinograde.

Ugodne življenjske razmere za razvoj koristnih živalskih vrst bomo dosegli zlasti s trajno ozelenitvijo vinogradov in ustvarjanjem ugodnih življenjskih razmer za naravne sovražnike. Pomembno je ohranjati vse vrste naravnih sovražnikov, kot so najezdiki, muhe trepetalke, tančičarice, plenilske stenice, polonice in drugi, še posebno pozornost pa je glede na probleme škodljivih pršic na vinski trti treba posvetiti plenilskim pršicam iz družine *Phytoseiidae*. Nujno je nenehno spremljanje njihove populacije in jih po potrebi tudi namerno vnašati.

8.1.3 Biotehniški ukrepi

V vinogradništvu spada med te ukrepe zlasti metoda zbežanja (konfuzije) s pomočjo feromonskih dispenzorjev proti grozdnima sukačema. Metodo pa bi kazalo uvesti šele po preizkušanju in v zaokroženih območjih.

8.1.4 Kemični način

Kadar je kljub uporabi prej omenjenih ukrepov presežen prag škodljivosti, smemo uporabiti kemični način varstva vinske trte. Za škodljivce so ti pragovi navedeni v prilogi.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev je potrebno dosledno spoštovati Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih, ter ostale, zgoraj navedene predpise. FFS se sme uporabljati le za namen in na način naveden na etiketi oziroma navodilu za uporabo, ki je skladen z odločbo o registraciji ali posebnim dovoljenjem za uporabo. Aplikacija fitofarmaceutskih sredstev mora biti v skladu z normami v teh navodilih in prilagojena gojitveni obliki vinske trte in stanju vegetacije. Poskrbeti je treba, da je izguba škropiva zaradi zanašanja, izhlapevanja ali odtekanja kapljic na tla čim manjša. Uporabniki FFS morajo imeti veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine in tretiranja opravljati s testiranimi napravami za nanašanje. Prav tako pa je pomembno tudi pravilno shranjevanje FFS ter ravnanje z njihovimi odpadki oziroma odpadno embalažo.

Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem opozorilom (varnostni pasovi, vode, čebele!) in razlikam pri uporabi za FFS za varstvo vinske trte za pridelavo vinskega in namiznega grozdja.

Hkrati je pri izbiri FFS obvezno treba upoštevati navodila in dosledno uporabljati samo tiste pripravke, ki so izrecno navedeni v seznamu dovoljenih kemičnih sredstev, saj gre za sredstva, ki so bolj ali manj selektivna in malo škodljiva za okolje in tla, ljudi in koristne živali ali izbrati fitofarmaceutska sredstva ali druge pripravke, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.

V primeru, da se v določenem letu pokaže nujna uporaba FFS, ki v teh tehnoloških navodilih ni dovoljena, se le-to lahko izjemoma uporabi ob pogoju, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na osnovi soglasja vsaj dveh članov strokovne delovne skupine, ki sta zadolžene za varstvo vinske trte, izda posebno dovoljenje za izredni ukrep in o

tem takoj obvesti organizacijo za kontrolo, pristojne inšpekcije in vinogradnika oziroma vinogradnike, v primeru, da gre za dovoljenje za izredni ukrep na širšem območju.

MKGP dovoli pridelovalcu ali skupini pridelovalcev izredni ukrep na predlog pridelovalca ali skupine pridelovalcev, ki ga posredujejo v obliki vloge, za katero se plača upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07 ZUT-G).

8.2 OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Opazovalno-napovedovalna služba za varstvo rastlin skuša glede na razvoj škodljivih organizmov in gojenih rastlin napovedati škodljivo biološko fazo in primeren čas ukrepanja z navedbo sredstev za varstvo rastlin, ki so registrirana in na tržišču prepoznana kot učinkovita.

Napovedi in informacije so javno dostopne v časopisih, na spletnih straneh (http://www.fito-info.bf.uni-lj.si/Prognoze/pregled_new/), na telefonskih odzivnikih ali pa se je mogoče na posameznih centrih celo naročiti pisne informacije.

| Območje | Ustanova | Telefonski odzivnik | Pisne informacije |
|--|--|---------------------|---|
| Osrednja Slovenija in Gorenjska | Kmetijski inštitut Slovenije | 01/280-52-62 | Teletekst Časopisi Fito-info http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web |
| Severovzhodna Slovenija (Štajerska in Pomurje) | Kmetijsko gozdarski zavod Maribor | 090/93-98-12 | Vinogradniške informacije Fito-info http://www.kmetijski-zavod.si |
| Celjska in Koroška | Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije | 03/71-21-660 | Vinogradniške informacije Fito-info http://www.ihps.si/index.php?lang=si |
| Zahodna Slovenija (Primorska) | Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica | 090/93-98-15 | http://www.kvz-ng.si/nasveti Fito-info |
| Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska, Posavje, Bela Krajina) | Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto | 090/93-98-17 | Fito-info http://www.kmetijskizavod-nm.si/ |

8.3 INTEGRIRANO VARSTVO PRED BOLEZNIMI VINSKE TRTE

8.3.1 Peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*)

Zaradi klimatskih razmer v Sloveniji pridelovanje grozdja brez kemičnega varstva vinske trte pred peronosporo praviloma ni mogoče. Gliva prezimi v odpadlem listju, kjer oblikuje zimske ali spolne trose. Ti so sposobni kaliti, ko vsota efektivnih temperatur znaša 170⁰ C, kot efektivne temperature pa vzamemo vse viške temperatur nad 8⁰ C od 1. januarja dalje. Ko vsota doseže omenjeno vrednost, moramo paziti na vremenske razmere, da ugotovimo, kdaj je do prve okužbe resnično prišlo. Pri nas je to navadno sredi maja ali v drugi polovici maja, odvisno pa je od vremenskih razmer v marcu in aprilu.

Prvo škropljenje je treba opraviti, ko ga napove prognostična služba, oziroma ko so mladike dolge okoli 30 do 40 cm.

Zaradi velike nevarnosti peronospore se pri nas ni uveljavilo kurativno škropljenje, pač pa je v uporabi izključno preventivni način. Postopamo tako, da v rednih presledkih škropimo, presledki pa so odvisni od na novo prirasle površine listov in jagod, od količine padavin in od trajanja delovanja uporabljenega fungicida. Presledki tako znašajo 7 do 10 dni, v kolikor pa po škropljenju ni bilo padavin, jih lahko podaljšamo na 12 dni, izjemoma celo na 14 dni. Krajši presledek velja, kadar je po škropljenju padlo več kot 30 mm dežja.

Prva škropljenja opravimo praviloma s kontaktnimi organskimi fungicidi, temu sledita dve škropljenji s sistemiki. Če uporabljamo pripravke, ki vsebujejo fosetil Al jih je priporočljivo uporabiti trikrat zapored. Po prehodu s sistemikov nazaj na kontaktne fungicide naj presledek po zadnji uporabi sistemika ne bo daljši od 10 dni. Bakrove pripravke uporabljamo predvsem za zadnja zaključna škropljenja. Škropljenje praviloma zaključimo nekje sredi avgusta. V vinogradih, ki so namenjeni za pozne trgatve, izjemoma škropimo še v začetku septembra.

Splošne omejitve za fungicide iz skupine ditiokarbamatov.

Zaradi negativnih stranskih učinkov na koristne plenilske pršice je omejena uporaba fungicidov, ki vsebujejo aktivne snovi iz skupine DITIOKARBAMATOV. V to skupino spadajo vsi pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi MANKOZEB, METIRAM ali PROPINEB (glej tabelo!). Pripravke, ki vsebujejo samo aktivne snovi iz te skupine (enokomponentni pripravki – v tabeli označeni z ②) smemo uporabiti SKUPNO največ 2 krat v eni rastni dobi. Dodatno lahko še največ 2 krat uporabimo sestavljene fungicide, ki poleg drugih aktivnih snovi vsebujejo tudi ditiokarbamate (v tabeli označeni z ③). V eni sezoni smemo torej uporabiti pripravke ki vsebujejo katerokoli aktivno snov iz skupine ditiokarbamatov največ 4 krat. Ta omejitev velja tudi v primeru, če uporabljamo samo sestavljene fungicide z vsebnostjo ditiokarbamatov. Da čimbolj zmanjšamo negativne učinke teh fungicidov na koristne plenilske pršice, jih uporabljamo predvsem v začetku škropilne sezone in se po možnosti izogibamo zaporednemu tretiranju z njimi.

Preglednica 7: Dovoljeni fungicidi pri zatiranju peronospore – kontaktni fungicidi

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g, ml/100 l vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|----------------------------|---|---|-------------------------|--|--|
| KONTAKTNI FUNGICIDI | | | | | |
| azoksistrobin | Quadris | 75-100 | 21 | N | Deluje tudi proti oidiju, črni pegavosti vinske trte in rdečemu listnemu ožigu |
| azoksistrobin + folpet | Universalis*** | 200 | 35 | N | Deluje tudi proti oidiju, in rdečem listnem ožigu. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja. |
| bakrov hidroksid + Zn | Cuprablau Z Cuprablau Z ultra | 300 250 | 28 | N | Pripravki na osnovi bakra so priporočljivi predvsem za zadnja škropljenja. Pri njihovi uporabi moramo biti previdni, če so napovedane nenadne ohladitve, ker lahko povzročajo ožige. |
| bakrov hidroksid | Champion 50 WP Champ formula 2 FLO Kocide DF Kocide 2000 | 200-250 200 150 - 200 150- 200 | 21 21 35 35 | N | |
| bakrov oksid | Nordox 75 WG | 100-150 | 35 | N | |
| bakrov oksiklorid | Ramin 50 | 500-750 | 21 | N | |
| bakrov oksisulfat | Kupro 190 SC | 750 | 28 | N | |
| bakrov sulfat | Bordojska brozga – Scarmagnan | 600 – 800 | Namizno 21 Vinsko 28 | N | |
| | Bordojska brozga – Caffaro WP | 600 -800 | | | |
| ciazofamid | Mildicut | 200 – 400 | 21 | N | Največ 4 X v eni sezoni Do začetka cvetenja se tretira v odmerku 2 L/ha, v času cvetenja 3 L/ha in po cvetenju v odmerku 4 L/ha. |
| ditianon | Delan 700 WG | 50 | 42 | N | Deluje proti rdečemu listnemu ožigu in črni pegavosti vinske trte. |
| folpet | Folpan 80 WDG *** | 125-150 | 35 | N | Pripravki, ki vsebujejo samo folpet se smejo uporabiti največ 4 krat letno. Ta omejitev ne vključuje kombiniranih pripravkov s folpetom. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| klorotalonil | Bravo 500 SC | 300 | 28 | N | Skupaj največ 2 krat v eni rastni dobi! |
| mankozeb | Dithane DG Neotec Dithane M-45 Kor DG* | 200-250 200-250 200-250 | Namizno 21 Vinsko 42 | SŠ | ② DITIOKARBAMAT! Pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov mankozeb, metiram ali propineb smemo SKUPAJ uporabiti največ 2-krat v rastni dobi. |
| metiram | Polyram DF | 240 | Namizno 28 Vinsko 56 | SŠ | |

...nadaljevanje na naslednji strani

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

① N – nevtralen; SŠ – srednje škodljiv; Š – škodljiv.

② Glej opombo pri mankozebu in v poudarjenem besedilu pri peronospori!

□ Pri uporabi sestavljenih pripravkov, ki vsebujejo DITIOKARBAMATE (mankozeb, metiram, propineb) je potrebno upoštevati omejitve glede števila tretiranj, ki so navedene v besedilu pri peronospori.

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g, ml/100 l vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| propineb | Antracol* Antracol WG 70 | 200 200 | Namizno 21 Vinsko 42 | SŠ | ② DITIOKARBAMAT! Deluje proti rdečemu listnemu ožigu in črni pegavosti vinske trte. *7.2.2009 |
| propineb + bakrov oksiklorid | Bakreni antracol | 250-350 | Namizno 21 Vinsko 42 | N | ③ DITIOKARBAMAT! |
| zoksamid + mankozeb | Electis 75 WG | 150-180 | 28 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

① N – nevtralen; SŠ – srednje škodljiv; Š – škodljiv.

② Glej opombo pri mankozebu in v poudarjenem besedilu pri peronospori!

□ Pri uporabi sestavljenih pripravkov, ki vsebujejo DITIOKARBAMATE (mankozeb, metiram, propineb) je potrebno upoštevati omejitve glede števila tretiranj, ki so navedene v besedilu pri peronospori..

Preglednica 8: Dovoljeni fungicidi pri zatiranju peronospore – sistemski in polsistemski fungicidi

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g/ml /100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI | | | | | |
| benalaksil + bakrov oksiklorid | Galben C | 400-500 | 42 | N | Največ 2 x v sezoni! |
| benalaksil + mankozeb | Galben M | 200-250 | 42 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! Največ 2 x v sezoni! |
| benalaksil-M + folpet | Fantic F WG *** | 200 | 42 | | Največ 2 x v sezoni! *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| cimoksamil + bakrov oksiklorid | Curzate R | 200-300 | namizno 28 vinsko 42 | N | |
| cimoksamil + mankozeb | Curzate M | 200-300 | namizno 28 vinsko 42 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! |
| cimoksamil + famoksadon | Equation Pro | 40 | 28 | N | |
| cimoksamil + metiram | Aviso DF | 250 | namizno 28 vinsko 42 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! |
| cimoksamil + propineb | Antracol combi * | 200 | namizno 21 vinsko 42 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! Deluje proti črni pegavosti vinske trte in rdečemu listnemu ožigu. *8.3.2009 |
| cimoksamil + trifloksistrobin | Eclair 49 WG ** | 50 | 35 | N | največ 2 x v sezoni. Deluje proti oidiju vinske trte in črni grozdni gnibli. **31.8.2009 |
| dimetomorf + folpet | Forum star *** / * | 175 | 42 | SŠ | *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja *9.5.2009 |
| mandipropamid | Revus | 40 - 60 | 21 | | Največ 3 x v sezoni |
| mandipropamid + folpet | Pergado *** | 160 - 250 | 35 | | glede odmerka glej navodila! *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| dimetomorf + mankozeb | Acrobat MZ WG | 250 | namizno 28 vinsko 42 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! |
| fenamidon + fosetil-Al | Verita | 250 | 42 | N | |
| fluopikolid + fosetil-Al | Verita profiler | 250 - 300 | 28 | | Največ 3 x v sezoni! |
| folpet + fosetil-Al | Mikal Flash *** / * | 300-400 | 42 | N | Delujeta tudi proti črni pegavosti vinske trte. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja *9.5.2009*14.5.2009 |
| iprovalikarb + folpet | Melody combi WP 43,5 *** / * | 250 | 35 | SŠ | *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja *9.5.2009 |
| iprovalikarb + propineb | Melody duo WP 66,8 | 200 - 250 | 28 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! |
| metalaksil-M + bakrov oksiklorid | Ridomil gold plus 42,5 WP | 300-400 | 35 | N | |
| metalaksil-M + folpet | Ridomil gold combi pepite *** / * | 200 | 28 | N | *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja *9.5.2009 |
| metalaksil-M + mankozeb | Ridomil gold MZ PEPITE | 250 | namizno 28 vinsko 42 | SŠ | DITIOKARBAMAT! |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE ** DATUM ODPRODAJE IN UPORABE ZALOG

① N – nevtralen; SŠ – srednje škodljiv; Š – škodljiv.

③ Pri uporabi sestavljenih pripravkov, ki vsebujejo DITIOKARBAMATE (mankozebe, metiram, propineb) je potrebno upoštevati omejitve glede števila tretiranj, ki so navedene v besedilu pri peronospori.

8.3.2 Oidij vinske trte (*Uncinula necator*)

Prednost pri zatiranju oidija v integriranem varstvu ima žveplo, vendar je zaradi njegove prenizke učinkovitosti ob veliki nevarnosti oidija nujna tudi uporaba organskih fungicidov, ki so navedeni v tabeli in za plenilske pršice niso škodljivi.

V vinogradih, kjer je bil v preteklem letu močan pojav oidija, moramo prvo škropljenje opraviti že v času, ko so mladike dolge 5 do 10 cm. Za to škropljenje so primerni tako sistemiki, kakor tudi pripravki na osnovi močljivega žvepla. V primeru kombiniranega zatiranja črne pegavosti ali rdečega listnega ožiga je mogoče uporabiti tudi Quadris ali Stroby WG ali Universalis. Pozneje škropimo proti oidiju tako, da pri škropljenjih proti peronospori dodajamo sredstva proti oidiju. Pred cvetenjem je priporočljivo uporabljati predvsem močljiva žvepla. Pri uporabi sistemika proti peronospori dodajamo tudi sistemik ali drugi fungicid z dolgotrajnejšim delovanjem proti oidiju (strobilurini, kvinoksifen, idr). Ta sredstva uporabljamo v času največje nevarnosti za okužbo z oidijem, to je od končanega cvetenja do zadnje dekade julija. V toplih in bolj suhih letih presledki med škropljenji proti oidiju ne bi smeli biti daljši kot 12 dni. V kolikor želimo shajati samo z močljivim žveplom, moramo škropljenje ponavljati vsakih 5 do 6 dni.

V primeru, da nas oidij preseneti in se močneje pojavi, škropimo dvakrat s sistemikom v razmaku 5 do 7 dni, pri čemer rabimo večjo količino vode (1000-1200 L/ha), da grozdje dobro omočimo. Pri občutljivih sortah (npr. chardonnay, rumeni muškat, refošk) in na območjih, kjer je nevarnost za oidij zelo velika je dovoljena tudi uporaba fungicidov na osnovi dinokapa, vendar ne več kot 1-krat v eni rastni dobi. V izjemnih primerih, če se ugotovi odpornost oidija na IBE fungicide in drugi fungicidi ne zagotavljajo ustrezne učinkovitosti, lahko strokovna delovna skupina na podlagi vloge pridelovalca in oglada odobri tudi večkratno tretiranje s pripravki na podlagi dinokapa.

Preglednica 9: Dovoljeni fungicidi pri zatiranju oidija

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g,ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--|---|
| <i>Ampelomyces quisqualis</i> | AQ-10 | 3,5 (35 g/ha) | 1 | N | Biološki pripravek na osnovi superparazitske glive. Primeren posebej za ekološko vinogradništvo. Uporabimo ga, ko opazimo prve okužbe. Pri uporabi tega sredstva ne smemo vsaj 2 dni po škropljenju uporabiti sredstev na osnovi bakra in vsaj 7 dni na osnovi ditiokarbamatov in nekaterih drugih fungicidov (glej navodila za uporabo!). |
| azoksistrobin | Quadris | 75 - 100 | 21 | N | Deluje tudi proti peronospori, rdečemu listnemu ožigu in črni pegavosti vinske trte. |
| azoksistrobin + folpet | Universalis*** | 200 | 35 | N | Deluje tudi proti peronospori vinske trte, in rdečem listnem ožigu. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| boskalid + krezoksime-metil | Collis SC* | 30 – 40 | 28 | N | Uporaba do 3 x letno. Ima stransko delovanje proti sivi grozdni plesni. * 5.6.2009 |

...nadaljevanje na naslednji strani

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|-------|---|
| krezoksim-metil | Stroby WG* | 10-20 | 35 | N | Deluje tudi proti črni pegavosti in rdečemu listnemu ožigu vinske trte. *31.1.2009 |
| trifloksistrobin + cimoksanil | Eclair 49 WG** | 25 | 35 | N | Deluje tudi proti peronospori in črni grozdni gnilobi. **31.8.2009 |
| kvinoksifen | Crystal | 15-20 | namizno 21 vinsko 30 | N | |
| metrafenon | Vivando | 0,16 - 0,20 L/ha | 28 | N | Uporaba do 3 x letno; do cvetenja nižji odmerek, po cvetenju pa višji |
| žveplo v prahu | Žveplo v prahu Scarmagnan Žveplo v prahu Solfotecnica | 15-30 kg/ha | 28 | Š | Do konca cvetenja, za občutljive sorte do zapiranja grozdov. |
| močljivo žveplo | Cosan**** Kalinol 80 WG**** Kumulul DF* Močljivo žveplo Pepelin**** | 3-6 kg/ha | 28 | N(SŠ) | V nižjih odmerkih do 200 g na 100 l vode ni škodljivo za plenilske pršice, razen za občutljive vrste; v odmerkih nad 300 g na 100 l vode pa je škodljivo. *15.3.2009 ****S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m florisne širine od meje brega voda 1. in 10 m od meja brega voda2. reda |
| | Thiovit Jet | 3-6 kg/ha | | SŠ | |
| miklobutanil | Systhane 12-E | 15-25 | 14 | N | <u>IBE fungicidi:</u> Zaradi možnosti razvoja odpornosti oidija na te fungicide, smemo pripravke z enako aktivno snovjo uporabiti največ 3 krat v eni rastni dobi. 1* 5.10.2009 2* 28.7.2009 3* 31.12.2009 *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| penkonazol | Topas 100 EC *1 | 25 | 35 | | |
| tebukonazol | Folicur EW 250 | 30 | 42 | | |
| tebukonazol + spiroksamin + triadimenol | Falcon EC 460 *2 | 30-40 | 35 | | |
| tebukonazol + trifloksistrobin | Nativo 75 WG | 0,18 kg/ha | 14 | | |
| tettrakonazol | Domark 100 EC*** | 25 | 30 | | |
| dinokap | Karathane EC*** / *3 | 40- 60 | 42 | Š | Največ 1 tretiranje s pripravki na osnovi dinokapa v eni rastni dobi *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| miklobutanil + dinokap | Sabithane *** | 30-40 | 42 | SŠ | |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

** DATUM ODPRODAJE IN UPORABE ZALOG

① N – nevtralen; SŠ – srednje škodljiv; Š – škodljiv.

8.3.3 Črna pegavost vinske trte (*Phomopsis viticola*)

Škropimo samo močnejše okužene vinograde. Škropljenje brez utemeljenega razloga ni dovoljeno. Če je potrebno, škropimo v fenološki fazi D (mladice dolge 1 do 2 cm) in E (mladice dolge 2 do 5 cm). Če za to uporabljamo pripravke, za katere je število tretiranj v eni rastni dobi omejeno, je to potrebno upoštevati pri uporabi zoper ostale bolezni vinske trte.

Preglednica 10: Dovoljeni fungicidi pri zatiranju črne pegavosti

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g,ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|
| azoksistrobin | Quadris | 75-100 | 21 | N | Deluje tudi proti oidiju in peronospori in rdečemu listnemu ožigu |
| bakrov oksid | Nordox 75 WG | 100-150 | 35 | N | Deluje proti peronospori vinske trte. |
| bakrov hidroksid | Kocide DF | 250-300 | 35 | N | Deluje proti peronospori vinske trte. |
| bakrov hidroksid | Kocide 2000 | 150-200 | 35 | N | Deluje proti peronospori vinske trte. |
| ditianon | Delan 700 WG | 75 | namizno 21 vinsko 42 | N | Deluje proti peronospori vinske trte. |
| folpet | Folpan 80 WDG*** | 125-150 | 35 | N | Pripravki, ki vsebujejo samo folpet se smejo uporabiti največ 4 krat letno. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| klorotalonil | Bravo 500 SC | 300 | 28 | N | Skupaj največ 2 krat v eni rastni dobi! |
| krezoksim-metil | Stroby WG* | 9 | 35 | N | Deluje tudi proti oidiju in rdečemu listnemu ožigu vinske trte. *31.1.2009 |
| metiram | Polyram DF | 300 | namizno 28 vinsko 56 | SŠ | ② DITIOKARBAMAT! Deluje proti peronospori vinske trte. |
| propineb | Antracol* Antracol WG 70 | 250 250 | namizno 21 vinsko 42 | SŠ | ② DITIOKARBAMAT! Deluje proti peronospori vinske trte. *7.2.2009 |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

① N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š - škodljiv.

② Glej opombo pri peronospori!

8.3.4 Rdeči listni ožig (*Pseudopeziza tracheiphila*)

Rdeči listni ožig je bolezen, ki se ne pojavlja vsako leto in je večinoma omejena na določene lege. Pri nas se pogosteje pojavlja na nekaterih legah v podravski in posavski vinorodni deželi, medtem ko je bolezen na Primorskem skoraj neznana in ne povzroča škode. Zoper to bolezen škropimo redno le vinograde, kjer se bolezen pogosto pojavlja, in sicer ko so poganjki dolgi 10 do 15 cm.

Preglednica 11: Dovoljeni fungicidi pri zatiranju rdečega listnega ožiga

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g/ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|
| azoksistrobin | Quadris | 75-100 | 21 | N | Deluje tudi proti oidiju, črni pegavosti vinske trte in črni grozdni gnilobi. |
| azoksistrobin folpet | + Universalis *** | 200 | 35 | N | Deluje tudi proti peronospori vinske trte, in oidiju vinske trte. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| cimoksanil + propineb | Antracol combi | 200 | 42 | SŠ | ③ DITIOKARBAMAT! Deluje proti peronospori vinske trte in črni pegavosti vinske trte. |
| ditianon | Delan 700 WG | 75 | namizno 21 vinsko 42 | N | Deluje proti peronospori vinske trte. |
| folpet | Folpan 80 WDG*** | 125-150 | 35 | N | Pripravki, ki vsebujejo samo folpet se smejo uporabiti največ 4 krat letno. *** - pripravek je registriran samo za pridelavo vinskega grozdja |
| klorotalonil | Bravo 500 SC | 300 | 28 | N | Skupaj največ 2 krat v eni rastni dobi! |
| krezaksim-metil | Stroby WG* | 9 | 35 | N | Deluje tudi proti črni pegavosti in oidiju vinske trte. *31.1.2009 |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

①N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š - škodljiv; ③ Glej opombo pri peronospori!

8.3.5 Siva grozdna plesen (*Botrytis cinerea*)

Siva plesen se včasih v mokrih letih pojavi že na kabrnkih. To lahko omilimo z uporabo fungicidov proti peronospori, ki imajo zaviralni učinek tudi proti sivi plesni (npr. folpet, klorotalonil). Škropljenje z botriticidi v tej fazi ni predvideno niti ni dovolj uspešno, da bi se izplačalo. Ta pojav sive plesni je navadno posledica prekomernega gnojenja z dušikom. Škoda na splošno ni posebno velika, saj preostali kabrnki nadomestijo izgubo. Napak pri gnojenju ni mogoče popravljati s škropljenjem.

Botriticide uporabimo le, če je to nujno potrebno zaradi občutljivosti sorte ali lege vinograda. Prvič škropimo, preden se jagode v grozdu strnejo. Že v tej fenološki fazi je treba vestno odstranjevati listje iz bližine grozdja in sploh poskrbeti za čim večjo zračnost trsov. Grozdje mora biti na prostem, da se po dežju in rosi čimprej posuši. Ta ukrep je obvezen. Izvajamo ga skladno in smiselno z lego in stopnjo osončenosti vinograda, da grozdja preveč ne izpostavimo "sončnemu ožigu".

Poskrbimo, da preprečimo močnejše poškodbe od grozdnih sukačev.

Drugo škropljenje opravimo, ko se jagode barvajo oziroma mehčajo. V tej fazi škropimo samo predel grozdja. Pri tem moramo že paziti na karenci uporabljenih pripravkov.

Preglednica 12: Dovoljeni fungicidi pri zatiranju sive grozdne plesni

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g, ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| boskalid | Cantus WG * | 100 – 120 | 28 | N | Uporaba 1 x letno. * 5.6.2009 |
| fenheksamid | Teldor SC 500 | 100-150 | namizno 14 vinsko 21 | N | Največ dvakrat v sezoni; škropiti samo predel grozdja. |
| fludioksonil +ciprodinil | Switch 62,5 WG | 100 | 21 | N | |
| Bacillus subtilis | Serenade WP | 250-400 | 3 | N | Uporaba 5 x letno. |
| pirimetanil | Mythos | 250 | 21 | N | Uporaba 1 x letno |
| | Pyrus 400 SC | 200 | 35 | | |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

① N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š - škodljiv.

8.4 INTEGRIRANO VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE

8.4.1 Grozdni sukači (pasasti – *Eupoecilia ambiguella*, križasti – *Lobesia botrana*)

Pri nas se pojavljata obe vrsti. Pasasti grozdni sukač razvije vedno le dva rodova, križasti pa navadno tri ali v manj ugodnih letih dva in nepopolni tretji rod. Praviloma prvega rodu ne zatiramo, razen če škropljenje izrecno priporoči strokovna služba.

Tudi proti drugemu rodu škropimo samo na podlagi pozitivne napovedi opazovalno napovedovalne službe, ali na podlagi lastnih opazovanj s priznanimi metodami spremljanja škodljivca (npr. feromonske vabe).

Natančen rok tretiranja napove opazovalno napovedovalna služba. Tudi proti drugemu rodu smemo škropiti samo enkrat, le v vinorodnih okoliših, kjer prevladuje križasti grozdni sukač in v tistih letih, ko je populacija drugega rodu grozdnih sukačev zelo številčna, je dovoljeno dvoje tretiranj z IRI insekticidi (Match 050 EC, Nomolt) ali MAC insekticidi (Mimic, Runner 240 SC) ali s pripravkom Laser in Steward. Izjema so tudi pripravki na osnovi bakterije *Bacillus thurgiensis*, kot je Delfin WG, s katerimi je treba škropiti dvakrat v razmaku 14 dni.

Zaželena je tudi metoda zbejanja (konfuzije), ker je okoljsko najbolj prijazna. Število feromonskih dispenzorjev na hektar vinograda in njihova razporeditev je odvisno od vrste dispenzorjev in izoliranosti vinograda od ostalih netretiranih vinogradov (upoštevati navodila proizvajalca).

Uporabo insekticidov proti 2. rodu grozdnih sukačev poskušamo izkoristiti tudi za sočasno zatiranje škržatkov prenašalcev fitoplazem, povzročiteljic rumenic vinske trte, tam kjer je to potrebno (glej poglavje Škodljivi škržatki).

Preglednica 13: Dovoljeni insekticidi pri zatiranju grozdnih sukačev

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g,ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice [Ⓛ] | Opombe |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|---|
| <i>Bacillus thuringhiensis</i> | Delfin WG* | 100-150 | - | N | dvakrat v razmaku 14 dni *24.3.2009 |
| indoksakarb | Steward | 12,5 | 10 | | Zatira tudi mlade ličinke ameriškega škržatka. |
| lufenuron | Match 050 EC | 100 | 28 | N | **29.9.2009 |
| metoksifenozid | Runner 240 SC | 30 | 14 | | |
| tebufenozid | Mimic | 60 | 21 | | |
| teflubenzuron | Nomolt** | 50-75 | 28 | | |
| klorpirifos | Pyrinex 25 CS | 100 | 21 | SŠ | Deluje tudi zoper ameriškega škržatka! Upoštevati 100 m varnostni pas do vodne površine. Kjer ni mogoče zagotavljati 100 m varovalnega pasu do nadzemnih voda, je uporaba tega sredstva strogo prepovedana. |
| klorpirifos-metil | Reldan 22 EC | 100 | 21 | SŠ | Največ 1 X v sezoni; Upoštevati 50 m varnostni pas do vodne površine. |
| spinosad | Laser | 15-20 | 14 | N-SŠ | |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

** DATUM ODPRODAJE IN UPORABE ZALOG

ⓁN - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š – škodljiv;

* Datum poteka veljavnosti registracije.

8.4.2 Škodljivi škržatki

Ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*): V primorskih vinogradih je ameriški škržatek splošno razširjen, v zadnjih letih pa se je močno razširil tudi v podravski in posavski vinorodni deželi. Neposredno škržatek ne povzroča nobene škode, pač pa je zelo učinkovit prenašalec nevarne zlate trsne rumenice (povzročitelj fitoplazma *Grapevine flavescence dorée* - FD). Ta je bila v letu 2005 prvič potrjena tudi na ozemlju Slovenije. Za zdaj je ugotovljena na nekaj mestih v Slovenski Istri ter na Dolenjskem. Povzročitelj bolezni ima status karantenskega škodljivega organizma (uvrščena je v prilogo II A 2 direktive 2000/29/ES), zato je na območjih, kjer je bolezen potrjena (t. i. razmejeno območje) izvajanje ukrepov za omejevanje širjenja te bolezni v skladu z »Odločbo o razmejitvi območij napada in ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice (fitoplazma *Grapevine flavescence dorée*)« obvezno in mora imeti prednost pred ostalimi strategijami. Hitro širjenje bolezni je mogoče obvladovati z zgodnjim odkrivanjem (ob sumu obvestiti FURS) tako, da se poleg sprotnega odstranjevanja okuženih trsov, v vinogradih vzdržuje kolikor je le mogoče majhna populacija ameriškega škržatka. Ameriški škržatek živi izključno na trti in ima en sam rod na leto. Zato je tudi njegovo zatiranje tehnološko razmeroma enostavno in tudi učinkovito.

Ukrepe iz omenjene odločbe je treba izvajati v vseh vinogradih na razmejenem območju. Ameriškega škržatka po možnosti zatiramo v skladu s tehnološkimi navodili iz omenjene odločbe, pri tem upoštevamo napovedi pazovalno napovedovalne službe za varstvo raslin. Za ta namen uporabljamo insekticide z nekoliko širšim obsegom delovanja, kot sta npr. klorpirifos in klorpirifos-metil. Indoksakarb (Steward) deluje le zoper ličinke in mlajše stadije nimf ameriškega škržatka, ne pa tudi zoper odrasle osebkke, zato je primeren le za morebitno prvo tretiranje v juniju. Ameriškega škržatka razmeroma dobro zatirajo tudi pripravki na osnovi piretrina. Ti pripravki so primerni zlasti pri ekološkem načinu pridelovanja grozdja.

V **proizvodnih vinogradih** na razmejenem območju je potrebno opraviti 2 tretiranja in sicer

1. tretiranje od 2 do 4 tedne po začetku izleganja ličink (Primorska: sredi junija) proti ličinkam in nimfam ameriškega škržatka;
2. tretiranje sočasno z zatiranjem 2. rodu grozdnih sukačev (Primorska: začetek julija) proti nimfam in prvim odraslim škržatom.

V **matičnih vinogradih** je potrebno izvesti 3 tretiranja in sicer:

1. tretiranje sredi junija (ko je vinska trta povsem odcvetela) proti ličinkam in nimfam ameriškega škržatka;
2. tretiranje v začetku julija proti nimfam ameriškega škržatka; to je tudi čas zatiranja 2. rodu grozdnih sukačev;
3. tretiranje konec julija proti odraslim oblikam ameriškega škržatka.

Informacije o razmejitvah in ukrepih na razmejenem območju so objavljene na spletni strani Fitosanitarne uprave http://www.furs.si/law/slo/zvr/slo/Odlocba_FD_2006jun15_web.pdf

Izven razmejenega območja je ameriškega škržatka priporočljivo zatirati v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, da se s tem zmanjša nevarnost morebitnega širjenja bolezni z okuženim materialom. V matičnih vinogradih ga zatiramo po napovedi opazovalne napovedovalne službe ali sočasno z zatiranjem 2. rodu grozdnih sukačev, če je to potrebno.

Navzočnost ličink in nimf ameriškega škržatka v vinogradih ugotavljamo s pregledovanjem listov ali njihovim otresanjem, navzočnost odraslih škržatkov pa z rumenimi lepljivimi ploščami.

Preglednica 14: Dovoljeni insekticidi pri zatiranju ameriškega škržatka

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g,ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice [Ⓛ] | Opombe |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--|---|
| indoksakarb | Steward | 15 | 10 | | Deluje samo na mlajše stadije ameriškega škržatka. Zatira tudi grozodne sukače! |
| klorpirifos | Pyrinex 25 CS | 100 | 21 | SŠ | Deluje tudi zoper odrasle oblike ameriškega škržatka! Upoštevati 100 m varnostni pas do vodne površine. Kjer ni mogoče zagotavljati 100 m varovalnega pasu do nadzemnih voda, je uporaba tega sredstva prepovedana. |
| klorpirifos-metil | Reldan 22 EC | 100 | 21 | SŠ | Največ 1 x v sezoni; Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine. |
| piretrin | Flora verde Kenyatox verde | 160 70-80 | 3 | | Učinek je boljši v kombinaciji z ogrščičnim oljem (0,5 %) |
| deltametrin | Decis 2,5 EC | 50 | 14 | Š | Samo v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. |

[Ⓛ]N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š – škodljiv; * Datum poteka veljavnosti registracije.

Zeleni škržatek (*Empoasca vitis*) je zelo občasen škodljivec v vinogradu in ga je potrebno le izjemoma zatirati. Prag škodljivosti je presežen, če na 100 pregledanih listov najdemo 100 ali več ličink. Odrasle živali pri tem zanemarimo. Pregledujemo spodnje in srednje liste na poganjku. Na Primorskem je pri ugotavljanju praga škodljivosti potrebno upoštevati tudi prisotnost zelo podobnega, a neškodljivega krhlikinega škržatka (*Zygina rhamnii*). Ta je pogosto prevladujoča vrsta v vinogradu. Če vrst ne znamo razlikovati, se posvetujemo s

strokovnimi službami. Zatiranje zelenega škržatka, če je to potrebno, v vsakem primeru poskušamo združevati z zatiranjem 2. rodu grozdnih sukačev. Zoper njega uporabljamo ista sredstva kot so navedena pri ameriškem škržatku.

8.4.3 Veliki trtni kapar (*Neopulvinaria innumerabilis*), češpljev kapar (*Parthenolecanium corni*) in druge vrste kaparjev

Kaparji so na vinski trti bolj občasni škodljivci. Najbolj škodljiv je veliki trtni kapar, ki je za zdaj razširjen le na Primorskem. Zatiranje kaparjev je zato potrebno samo v izjemnih primerih, če se ti močnejše namnožijo in naravni sovražniki niso dovolj učinkoviti. Kaparji se v vinogradu ponavadi pojavijo v gnezdih na posameznih trsih ali skupini trsov, zato jih tudi tako zatiramo. Če so napadeni le posamezni trsi, lahko velikega trsnega kaparja učinkovito odstranimo tudi s krpo ali rokavico v času, ko izoblikuje vatasto jajčno vrečko, a preden se začnejo ličinke izlegati. Čas za to je od sredine maja do sredine junija.

Z uporabo selektivnih insekticidov proti grozdnim sukačem in drugim škodljivcem vinske trte, navadno omogočimo tudi naravnim sovražnikom, da kaparje zadržujejo pod pragom škodljivosti. V Sloveniji nimamo registriranega nobenega insekticida, s katerim bi lahko učinkovito zatrli velikega trsnega kaparja med rastno dobo, ko se izlegajo ličinke. Zato je zelo pomembno, da vinograde temeljito pregledamo že v času mirovanja in v primeru večje namnožitve uporabimo sredstva na osnovi olja oljne ogrščice v času brstenja vinske trte.

Preglednica 15: Dovoljeni insekticidi pri zatiranju kaparjev

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g/ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------------|--|---|
| olje oljne ogrščice | Ogriol | 8,0 L/ha | | | Škropljenje napadenih trt v fenološki fazi B-C (BBCH 02-05) |
| | Prima | 3000 | - | N | |

^①N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š - škodljiv.

8.4.4 Sovke (*Noctuidae*), zemljemerka (*Boarmia rhomboidaria*), trsni brstar (*Theresimima ampelophaga*)

Sovke, zemljemerka in trsni brstar so občasni škodljivci. Škodo povzročajo samo spomladi v času odganjanje vinske trte. Prag škodljivosti je 2 do 3 % izjedenih oces. Ko so goseničice še majhne, nanje zadovoljivo delujejo nekateri pripravki, ki se uporabljajo zoper grozdnih sukače (Pyrinex 25 CS, Mimic, Runner 240 SC). Pripravek Pyrinex 25 CS je strupen za čebele, zato je potrebno predhodno odstraniti vso cvetočo podrast in tretiranje izvesti v večernih urah, ko so čebele v panjih. Poleg tega je, zaradi strupenosti za vodne organizme potrebno upoštevati 100 m varnostni pas do vodnih površin.

8.4.5 Rdeča sadna pršica (*Panonychus ulmi*), rumena pršica (*Eotetranychus carpini*)

Rdeča sadna pršica prezimi v obliki rdečih zimskih jajčec. Največjo škodo povzroči spomladi kmalu po odganjanju vinske trte. Stremeti je treba za tem, da imamo v vinogradu plenilske pršice iz družine *Phytoseiidae*, ki po naravni poti varujejo trto pred škodo, ki jo lahko povzroči rdeča sadna pršica. Plenilske pršice je mogoče tudi umetno naseliti, pri čemer pomaga strokovna služba. Pomembno je, da jih s pravilno izbiro kemičnih sredstev ohranimo.

Rumena pršica je pogostejša na Primorskem. Prezimi odrasla samica. Večjo škodo lahko napravi na zelo toplih legah. Rada ima predvsem sorti 'refošk' in 'laški rizling'.

Če se dosledno držimo načel integrirane pridelave s pršicami praviloma ne bi smeli imeti težav. Če bi kljub temu prišlo do prereznožitve katere od omenjenih vrst, se odločamo za zatiranje samo na podlagi ugotovljenega preseženega praga škodljivosti. Pregled lističev vršimo, ko ima trta razvite prve lističe. Če ob pregledu najdemo več kot na 60 % pregledanih lističev eno ali več pršic, je zatiranje nujno. Poletno zatiranje je redkokdaj potrebno. Poleti je prag škodljivosti nižji in znaša 40 % naseljenih listov s pršicami. Pri tem upoštevamo tudi naseljenost s plenilskimi pršicami. Če je populacija le-teh v naraščanju, lahko zatiranje opustimo tudi če je prag škodljivosti nekoliko presežen.

Preglednica 16: Dovoljeni akaricidi

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g/ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| fenpiroksimat | Ortus 5 SC | 100 | 35 | N/SŠ | Če je pred cvetenjem napadenih > 60 % listov in je majhno število plenilskih pršic. Po cvetenju je prag škodljivosti 40 % naseljenih listov. |
| fenazakvin | Demitan | 50 | 49 | SŠ | |
| spirodiklofen | Envidor SC 240 | 40 | 14 | | |
| olje oljne ogrščice | Ogriol | 800 | - | N | V času brstenja proti zimskim jajčecem. |
| | Prima | 3000 | | | |
| klofentazin | Apollo 50 SC | 40 | zagotovljena s časom uporabe | N | V času izleganja ličink iz zimskih jajčec (april). Samo v primeru, če smo pri zimskem pregledu očes našli v povprečju več kot 20 jajčec na oko ali več kot 50 % očes z zimskimi jajčeci (pregledujemo 5. – 8. oko na rozgi). |

^①N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š - škodljiv.

8.4.6 Trsna kodravost ali akarinoza (povzročitelj *Calepitrimerus vitis*) in trsna pršica (*Colomerus vitis*)

Prag škodljivosti je zelo težko določiti. Upoštevamo napad v preteklem letu. Škropimo samo vinograde, ki so bili v preteklem letu močnejše napadeni. Tudi te pršice lahko učinkovito omejujejo plenilske pršice (*Phytoseiidae*), zato moramo paziti na to, da jih čimbolj ohranimo v vinogradu.

Če je potrebno škropimo trte v času brstenja v fenoloških fazah B-C po Baggiolini-ju (BBCH 02-05) s pripravki na podlagi žvepla, močljivega žvepla ali ogrščičnega olja. Učinkovitost žveplovih pripravkov je zelo odvisna od temperature, zato z njimi tretiramo, ko je lepo in toplo vreme in je takšno napovedano tudi v nekaj naslednjih dneh. V primeru močnega pojava akarinoze poleti lahko uporabimo sredstva na osnovi fenpiroksimata ali fenazakvina.

Preglednica 17: Dovoljena fitofarmaceutska sredstva pri zatiranju trsne kodravosti ali akarinoze in trsne pršice

| Aktivna snov | Pripravek | Odmerek (g/ml/100 L vode) | Karenca (dni) | Vpliv na plenilske pršice ^① | Opombe |
|--------------|-----------|---------------------------|---------------|--|---|
| fenazakvin | Demitan | 60 | 49 | SŠ | Dovoljen v fenološki fazi B –C skupaj z oljem oljne ogrščice ali sam v fenološki fazi D-F ob močnem napadu; največ enkrat v sezoni. |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------|------------------------------------|------|--|
| fenpiroksimat | Ortus 5 SC | 100 | 35 | N/SŠ | Glej opombo pod fenazakvin. |
| kalcijev polisulfid | Žvepleno apnena* brozga | 20-25 % | zagotovljena s časom uporabe | Š | V času brstenja v fenološki fazi B-C. Pogoji za dobro delovanje žveplovih pripravkov je toplo vreme v času po tretiranju – temp. nad 15 °C. *23.3.2009 |
| močljivo žveplo | Thiovit Jet | 800-1600 | 28 | SŠ | |
| olje oljne ogrščice | Ogriol | 800 | - | N | |
| | Prima | 3000 | | | |

* DATUM POTEKA VELJAVNOSTI REGISTRACIJE

①N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š - škodljiv.

8.5 TEHNIKA ŠKROPLJENJA

Pri škropljenju je treba paziti na to, da količina škropiva ustreza razvojnemu stadiju vinske trte. Poraba škropiva naj bo takšna, da ne bo odtekanja oziroma kapljanja in da so listi in pozneje grozdi dovolj dobro omočeni.

Od količine škropiva je odvisen tudi odmerek fitofarmaceutskega sredstva. Priporočene izhodiščne količine škropiva za preračun koncentracije v odmerek po hektarju bi bile naslednje:

- v fenološki fazi B ali C bi naj znašala poraba škropiva 400 do 600 L/ha,
- v fenološki fazi D ali E bi naj znašala poraba škropiva 400 do 600 L/ha,
- v času pred cvetenjem 600 do 700 L/ha,
- v času po cvetenju in do konca vegetacije 1000 do 1200 l/ha.
-

Pri manjši porabi vode od navedenih količin povečamo koncentracijo škropiva za tolikokrat, za kolikor smo zmanjšali porabo vode. Lahko tudi upoštevamo odmerek sredstva, ki ga dobimo na osnovi normalne porabe vode.

Primer: Pri normalni porabi vode v času pred cvetenjem uporabimo 700 l vode na ha in bi torej uporabljali normalno koncentracijo sredstva; npr. Antracol normalno uporabljamo v 0,2 % koncentraciji oziroma v odmerku v času pred cvetenjem 1,4 kg/ha. V primeru, da bi porabo vode zmanjšali na 350 l/ha, to je dvakrat manj od normalne porabe, moramo pripraviti dvojno koncentracijo, to je 0,4 % Antracol oziroma bi odmerek znašal 1,4 kg/ha, kakor je to potrebno. Bistvo je v tem, da odmerke prilagajamo rasti vinske trte.